کد کنترل

976





صبح جمعه ۱۳۹۸/۳/۲۴



«اگر دانشگاه اصلاح شود عملکت اصلاح می شود.» امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوستهٔ داخل ـ سال ۱۳۹۸

بیوشیمی بالینی ـ کد (۱۵۰۹)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ١٢٠

عنوان مواد امتحاني، تعداد و شمارهٔ سؤالات

يف	مواد امتحاني	تعداد سؤال	از شمارة	تا شمارة
١ ز	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳٠	,	٣٠
e Y	بيوشيمى	۴٠	T1	٧٠
٣	زيستشناسي	٣٠	٧١	١٠٠
F	شیمی آلی و عمومی	۲٠	1-1	17-

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمرهٔ منفی دارد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز میباشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می شود.

🕸 داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزلهٔ عدم حضور شما در جلسهٔ آزمون است.

		ود به جلسه، بالای پاسخنامه و	ی مندرج در بالای کارت ورو	اینجانب صندلی خود را با شمارهٔ داوطلب کد کنترل درج شده بر روی دفتر
	:L	امض		
			ي):	بان عمومی و تخصصی (انگلیس
Di				t completes each sentence.
1-		andry is the branch of at, fiber, milk, eggs, or		with animals that are
2-	1) handled Named by P	2) concerned ortuguese explorer Fer	3) included dinand Magellan, wh	4) interfered o believed it to be free of
	1) violent	storms, the Pacific Ocea 2) distant	3) temporary	
3-				ovement that
		itional view that all non		
02	1) asserts	magnifies		4) challenges
4-				that they will be
		o hunt them from the so		1) attention
5-	1) logic	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF		4) attention ne human brain and the
5-	computer.	imici an	analogy between th	ic numan brain and the
	1) drew	2) bore	3) took	4) put
6-	The second secon			that he hadn't really read
	the manuscri	pt.		
	1) intensity	ignorance	tolerance	superficiality
7-			기하다 하다 가지 않는 다음이 가지 않는데 가지 않는데 가게 되었다.	ion, but they weren't really
	얼굴하면 하게 됐다. 이 사람들이 없어 없다면 없다.	y had herded the sheep	사용 보기에 가를 잃었다면 되면 하셨다며 무슨 때문에 되었다고 있다면 하는데 모양하다요?	
	1) resistant	2) impatient	3) regretful	4) indifferent
8-		하이가 마음이 이번 없어 보다면 사내가 되었다면 하는데 생생이 되었다.	: () () () - () - () - () - () - () - ()	letely and the
		no idea what he was tal		1) offantlass
9-	1) solitary	2) inarticulate	3) curious	4) effortless ork in animals larger than
<i>y</i> -				ts in dogs.
	1) efficacy	2) restriction	3) sympathy	4) vulnerability
	,		- / - /	i i dillettionity

- 10- The African elephant has become the object of one of the biggest, broadest international efforts yet ----- to turn a threatened species off the road to extinction.
 - 1) intruded
- 2) explored
- 3) mounted
- 4) compensated

PART B: Cloze Test

<u>Directions</u>: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Scientists first recognized the value of the practice more than 60 years ago, when they found that rats (11) ------ a low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats and (12) ------ incidence of conditions that become increasingly common in old age. (13) ------, some of the treated animals survived longer than the oldest-living animals in the control group, (14) ------ that the maximum life span (the oldest attainable age), (15) ------ merely the average life span, increased.

11- 1) were fed

13- 1) Although

- 2) which they fed
- 3) fed
- 4) feeding

- 12- 1) had a reduced
- 2) they reduced
- were reduced

- that it reduced
 - 3) What is more 4) So that

- 14- 1) meant
- While
 which means
- 3) means
- 4) it means

- 15- 1) no
- 2) nor
- 3) neither
- 4) not

PART C: Reading Comprehension

<u>Directions</u>: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Although the body can use some variations of carbon compounds such as fatty acids and ketones as energy, carbohydrates play an important role in this way. First of all, maintaining a regular intake of carbohydrates will prevent protein from being used as an energy source. Gluconeogenesis will slow down and amino acids will be freed for the biosyntheses of enzymes, antibodies, receptors and other important proteins. Furthermore, an adequate amount of carbohydrates will prevent the degradation of skeletal muscle and other tissues such as the heart, liver, and kidneys. Most importantly, ketosis will be prevented. Although the brain will adapt to using ketones as a fuel, it preferentially uses carbohydrates and requires a minimum level of glucose circulating in the blood in order to function properly. Before the adaptation process occurs, lower blood glucose levels may cause headaches in some individuals.

Although the processes of protein degradation and ketosis can create problems of their own during prolonged fasting, they are adaptive mechanisms during glucose shortages. In summary, the first priority of metabolism during a prolonged fast is to provide enough glucose for the brain and other organs that are dependent upon it for energy in order to spare proteins for other cellular functions. The next priority of the body is to shift the use of fuel from glucose to fatty acids and ketone bodies. From then on, ketones become more and more important as a source of fuel while fatty acids and glucose become less important.

16-	The term	"Gluconeogenesis"	in the first	paragraph	refers to .	,
-----	----------	-------------------	--------------	-----------	-------------	---

- 1) consumption of carbohydrates
- 2) production of new glucose
- 3) intake of new carbohydrates
- 4) break down of glucose

17- Which statement related to carbohydrates as a source of energy is not true?

- 1) Amino acids would be used for production of other proteins.
- 2) Proteins would be analyzed to free amino acids.
- 3) They cause inhibition of utilizing proteins for energy production.
- 4) New synthesis of glucose decreases.

18- Amino acids are responsible for the biosyntheses of all the following items EXCEPT

1) fatty acids

2) antibodies

enzymes

4) receptors

19- Consumption of carbohydrates will benefit all of the following organ systems EXCEPT

1) urinary system

2) C.N.S

3) muscular system

4) respiratory system

20- The priorities of the body during a prolonged starvation are ------

- 1) providing ketone bodies and then fatty acids for the digestive system
- 2) providing glucose and then ketone bodies for the digestive system
- 3) providing fatty acids for the brain and then shifting to ketone bodies
- 4) providing glucose for the brain and then shifting to ketone bodies and fatty acids **PASSAGE 2**:

Fish oil is a commonly used fatty acid supplement because it is a source of omega-3 fatty acids. Fatty acids are strings of carbon atoms, having a range of lengths. If links are all single (C-C), then the fatty acid is called saturated; with one double bond (C=C), it is called monounsaturated; if there are two or more double bonds (C=C=C), it is called polyunsaturated. Only two fatty acids, both polyunsaturated, are considered essential to be obtained from the diet, as the others are synthesized in the body. The essential fatty acids are alpha-linolenic acid (ALA), an omega-3 fatty acid, and linoleic acid (LA), an omega-6 fatty acid. Plant oils, particularly seed and nut oils, contain alpha-linolenic acid. Dietary supplement sources include fish oil, krill oil and marine algae extracts. The class of nutrient compounds includes vitamins, minerals, fiber, fatty acids and amino acids.

Minerals are the exogenous chemical elements indispensable for life. Four minerals: carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, are essential for life but are so ubiquitous in food and drink that these are not considered nutrients and there are no recommended intakes for these as minerals. The need for nitrogen is addressed by requirements set for protein, which is composed of nitrogen-containing amino acids. Sulfur is essential, but for humans, not identified as having a recommended intake per se. Instead, recommended intakes are identified for the sulfur-containing amino acids

methionine and cysteine. There are dietary supplements which provide sulfur, such as taurine and methyl sulfonylmethane.

21-	All of the following	fatty acids should be	abtained from th	e diet EXCEPT	
21-	An of the following	iativ acius snouiu de	obtained from th	e diet. LACEFT	

1) linoleic acid

2) monounsaturated

polyunsaturated

4) alpha-linolenic acid

22- By consumption of plant oils, which fatty acid could be provided?

1) Alpha-linolenic acid

2) Monosaturated acids

3) Linoleic acid

4) Omega-6 fatty acid

23- According to the text, which of the following compounds are basically essential to life?

1) Collagen

2) Polyphenols

3) Minerals

4) Plant pigments

24- Which statement about minerals is consistent with the text?

- Minerals are rarely found in food and drink.
- 2) They are chemical elements produced in the body.
- 3) Minerals should be received from outside the body.
- 4) They are regarded as nutrients to be recommended for intake.

25- Human requirements for sulfur could not be provided by -----

1) pure sulfur

2) methionine

3) taurine

4) cysteine

PASSAGE 3:

Animal toxins from chemistry aspect, extends from enzymes and neurotoxic and cardiotoxic peptides and proteins to many small molecules such as biogenic amines, alkaloids, glycosides and terpenes. Drug toxicity is affected by all of factors that affect the toxicity of other xenobiotics, including individual (genetic) variation, diet, age, and the presence of other exogenous chemicals. Even when the risk of toxic side effects from a particular drug has been evaluated, it must be weighed against the expected benefits. The use of a very dangerous drug with only a narrow tolerance between the therapeutic and toxic doses may still be justified if it is the sole treatment for an otherwise lethal malady. Although the study of the therapeutic properties of chemicals falls within the province of pharmacology, essentially all therapeutic drugs can be toxic, at some dose.

The danger of producing deleterious effects to the individual depends on several factors, including the nature of the toxic response, the dose necessary to produce the toxic response, and the relationship between the therapeutic dose and the toxic dose. Some species from practically all phyla of animals produce toxins for either offensive or defensive purposes. Some are passively venomous, often following inadvertent ingestion, whereas others are actively venomous, injecting poisons through adapted stings or mouth parts. It may be more appropriate to refer to the latter group only as venomous and to refer to the former simply as poisonous.

26-	According	to	the	text,	the	principal	target	organs	for	proteins	of	animal	toxins	are
		_												

- 1) arteries and veins
- 2) bronchial tract
- 3) peripheral and central nervous system
- 4) heart and central nervous system
- 27- Which statement related to usage of a drug with toxic side effects is true?
 - 1) It should be applied with caution.
 - 2) It is not allowed and should be omitted.
 - It could be used only for fatal disease.
 - 4) Its toxic components should be eliminated first.
- 28- All of the following factors determine the harmful effects of toxins EXCEPT ------
 - 1) quality of the toxic response
 - the nature of manufacturing components
 - applying toxic dosages
 - 4) therapeutic and toxic dose correlation
- 29- Inactive poisoning by venoms may occur through which system?
 - 1) Alimentary canal

2) Respiratory tract

3) Urinary system

- 4) Vascular system
- 30- According to paragraph 2, the word poisonous can be appropriately used to refer to
 - 1) passively venomous species
 - actively venomous species
 - species injecting poisons through stings
 - 4) species not affected by venom

ىيوشىمى:

٣١ مهمترين آنزيم در كنترل سنتز كلسترول كدام است؟ Acyl CoA Synthetase (7 Thiolase () HMG-CoA Synthase (f HMG-CoA Reductase (* ٣٢ - كافئين از كدام باز مشتق مي شود؟ ۲) گوانین ۴) گزانتین ۳) آدنین ۱) اوراسیل ۳۳ − آپوپروتئین اصلی موجود در شیلومیکرونها کدام است؟ APOB_{Noo} (Y APOC, () APOE OF APOB_{FA} (T ٣٢- عملكرد اصلى لكتينها جيست؟ ۲) اتصال به اسیدهای جرب اتصال به اسیدهای آمینه خاص ۴) اتصال به کربوهیدارتها ٣) اتصال به پروتئينها ۳۵− در بیماری سلیاک، سیستم ایمنی بر علیه کدام مواد فعال میشود؟ ۲) گلوترها ۱) یلی ساکاریدهای غیرقابل هضم ۴) موکویلے ساکار بدھا ٣) ليبويلي ساكاريدها

	باشد.	م به پتاسیم باید	مقادير طبيعي نسبت سدي	-48
	۲) بالاتر از ۲۰ به ۱		۱) کمتر از ۲۳ به ۱	
	۴) کمتر از ۲۰ به ۱	7.16	۳) بالاتر از ۲۵ به ۱	
	مىدھد؟	ر تجمع کدام اسید چرب رخ	عارضه مغزی رفسام، در اث	-27
۴) لینولنیک اسید	۳) پالمتیک اسید	۲) پروپیونیک اسید	۱) اسید فیتانیک	
م <i>ىگ</i> ىرد؟	ندام اندامک سلولی صورت	یراشباع از ا <mark>نواع اشباع، در ک</mark>	بیوسنتز اسیدهای چرب غ	-31
۴) شبکه اندوپلاسمی	۳) میتوکندری	۲) دستگاه گلژی	۱) هسته	
		ن (RT) یک:	آنزيم رونوشت ساز معكوس	-49
به DNA است.	۲) DNA پلیمراز وابسته	ه RNA است.	۱) DNA پلیمراز وابسته ب	
به RNA است.	۴) RNA پليمراز وابسته	ه DNA است.	۳) RNA پلیمراز وابسته ب	
ں چگونہ است؟	از Km باشد، سرعت واكنش	غلظت سوبسترا خيلي كمتر	در یک واکنش آنزیمی که	-4.
سترا است.	۲) متناسب با غلظت سوب		۱) به v max میرسد.	
جه صفر است.	۴) از نظر سینتیکی از در۰	است.	۱) به ۷ max میرسد. ۳) مستقل از درجه حرارت	
			کدام آنزیم از گروه ترانسف	-41
AST (*	ALT (*	ACP (r	CPk (1	
وره کدام ترکیب است؟	شساز اصلی و بدون واسطه ا	سم بازهای آلی نیتروژندار، پی	در ماهیان استخوانی، متابولی	-42
۴) آلانتوئين	۳) آلانتوئیک اسید	۲) گزانتین	۱) اوریک اسید	
وارد سیکل کربس میشود؟	ینه میتونین، از کدام طریق	مینه، اسکلت کربنی اسید آم	در کاتابولیسم اسیدهای آه	-44
	۲) آلفا ۔ کتوگلوتارات		۱) اگزالواستات	
A	۴) سوكسينيل ـ كوآنزيم		٣) فومارات	
96	دتاً مشتق از كدام قند است	فورز DNA به کار میرود، عم	ماده آگارز که برای الکتروه	-44
۴) گالاکتوز	۳) لاکتوز	۲) گلوکز	۱) گلوکز آمین	
ِفتار نموده و به سمت	ود بهصورت یک	در pH بالاتر از نقطه PI خ	در الكتروفورز، پروتئينها	-40
			حركت مىكند.	
۴) آنيون ـ آند	٣) آنيون ـ کاتد	۲) کاتیون ـ کاتد	۱) کاتیون ـ آند	
ِ هپاتوسیتها، کدام ترکیب زیر	م نیتریک اکساید سنتاز در	، اکساید (NO) توسط آنزیر	در تشکیل ترکیب نیتریک	-48
			شرکت <u>ندارد</u> ؟	
۴) آرژنین	O ₇ (7	NADH (*	ATP (1	
ویتامین نقش ضروری دارد؟	ن بتا ــ هيدروكسيلاز، كدام	ی نفرین توسط آنزیم دوپامی	در تبدیل دوپامین به نوراپ	-44
\mathbf{B}_{1} ويتامين (۴	۳) ويتامين D	۲) ویتامین C	۱) پانتوتنیک اسید	
ت میکائیلیس برابر با ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰	لیتیک معادل S ^{-۱} و ثاب	,تواند یک آنزیم با ثابت کاتال	چه غلظتی از سوبسترا می	-41
	93	مف سرعت ماكزيمم عمل كند	مولار را قادر سازد که با نص	
۴) ۱ میلیمولار	۳) ۲ میلیمولار	۲) ۲/∘ میلیمولار	 ۲۵/۰ میلیمولار 	
لت میشود؟	دام آنزیم در میتوکندری یا	برای همانند سازی DNA ک	در سلولهای یوکاریوتیک	-49
۴) آلفا DNA پليمراز	۳) بتا DNA پلیمراز	۲) دلتا DNA پلیمراز	۱) گاما DNA پلیمراز	

	آغاز میشود؟	ااتصال کلسیم به کدام مورد آ	انقباض عضله اسكلتي ب	-ƥ
۴) تروپومیوزین	۳) میوزین	۲) تروپونین	۱) اکتین	
	آمینواسید تولید میشود؟	ق با دکربوکسیلاسیون کدام	تركيب متسع كننده عرو	-41
۴) گلوتامین	۳) هیستیدین	۲) آسپارتیک اسید	۱) آرژنین	
		ا تحمل مىكند؟	انسان کمبود کدامیک ر	-54
۴) پروتئین	۳) يد	۲) لیپید	۱) کربوئیدرات	
	دام است؟	عاد شده به وسیلهٔ پانکراس ک	عامل هیپرگلیسیمی ایج	$-\Delta \Upsilon$
۴) گلوکاگون	۳) انسولین	۲) لیپاز	۱) تیروکسین	
		بافت پیوندی شامل چیست؟	ماتريكس خارج سلولى	-54
۴) توبولین	۳) انیولین	۲) اکتین	۱) فيبرونكنين	
	صفراوی استفاده میشود؟	مول برای اتصال به اسیدهای	از كدام تركيب بهطور مع	-55
۴) گلیسین	۳) گلوکورونات	۲) سولفات	۱) اسیدهای چرب	
بدیل به پیرووات میشود؟	د به سیکل اسیدسیتریک، ت	ه از اسید آمینهها قبل از ورو	اسکلت کربنی کدام گرو	-68
۴) گلاسين، ليزين	٣) لوسين _ آلانين	۲) ترهانین، سیستئین	۱) سرین، تایروزین	
	رتات تولید میشود؟	عامل آمین به کدام یک، آسپار	در داخل بدن، با انتقال	$-\Delta V$
۴) آلفا _ كتوگلوتارات	٣) اگزالواستات	۲) پیروات	۱) فومارات	
	ىتند؟	ك آنتىاكسيدان تغذيهاى <u>نيس</u>	کدامیک از موارد زیر یک	-51
۴) ويتامين C	۳) ویتامین E	۲) بتاکاروتن	۱) ويتامين ۲	
	موجود است؟	/tRN بالغ، كدام رديف بازى ه	در انتهای ۳ مولکول ۸	-49
ACC-4' (4	AAC-r' (r	CCA-T' (T	CAA-" (1	
		بهار م <i>ی کند</i> ؟	آسپرین کدام آنزیم را م	-9.
۴) ليپواكسيژناز	۳) فسفولیپاز D	۲) لیپاز	۱) سیکلواکسیژناز	
ه جانبی آن ۵۳ /۱۰ و PK گروه	۲/۱ و PK گروه آمین زنجیر	، PK گروه کربوکسیل آن ۸	اگر در اسیدآمینه Lys	-81
		باشد. PI آن کدام است؟	آمین انتهایی آن ۸/۹۵	
10/08 (4	9,74 (8	۵/۵۶ (۲	8,50 (1	
		بر ۷ است؟	در کدام محلول pH برا	-84
		$\frac{1}{\Lambda^{-}}$ مساوی $\frac{HA}{\Lambda^{-}}$	$\omega_{9} \text{ Ka} = 1 \times 10^{-3} \text{ (1)}$	
		سبت HA مساوی ۱۰۰	۲) Ka = ۱×۱۰ و ند	
		$\frac{1}{\Lambda}$ مساوی $\frac{HA}{\Lambda}$	۳) Ka = ۱×۱۰ و ن	
		۱۰ مساوی ۱۰ سبت <mark>A م</mark> ساوی		
		7.70	باز آلی موجود در نوکلئو	-88
۴) هیپوگزانتین	۳) گزانتین		۱) متیلگزانتین	

-84	از بتا اکسیداسیون کامل اس	ید چرب ۱۶ کربنه و دارای یک	پیوند دوگانه «روی اتم کربن ف	رد»، کدام یک تولید نمی شود؟
	YFADH _Y (1	YNADH,H+ (T	AAcetyl-coA (*	۴) گزینهٔ ۱ و ۲
-80	کدام مورد در گروه متفاوت	ی نسبت به بقیه قرار میگیرد	9.	
	۱) گانگلیوزید	۲) اسفنگومیلین	۳) پلاسمالوژن	۴) لاکتوزیل سرامید
-99	تمام ترکیبات زیر بهجز	از مشتقات کلسترو	ل محسوب میشوند.	
	۱) استرادیول	۲) کولیک اسید	۳) کلسی تریول	۴) توكوفرول
-64	از هیدرولیز کامل کدام مل	کول، تعداد بیشتری گلیسروا	<i>ے</i> اصل میشود؟	
	۱) سفالین		۲) کاردیو لیپین	
	٣) فاكتور فعال كننده پلاك	تى	۴) فسفاتيديل اينوزيتول	
-61	آنزيم كراتين كيناز متشأ	کل از دو زنجیره پلیپپتید:	ی مختلف و بهصورت دایمی	است. در صورتی که تمامی
	احتمالات تركيب دو زنجير	ه مختلف اتفاق بیفتد، کراتیر	ن کیناز دارای چند ایزوآنزیم ۰	خواهد بود؟
	۴ (۱	7 (7	1 (7	٣ (۴
-99	کدامیک از یونهای فلزی	در واکنش DNA پلیمرازی	شركت مىكند؟	
	Mg (1	Mn (۲	Zn (*	Ca (f
- y •	کدام آنزیم نقش کلیدی د	ر تنظيم متابوليسم ليپيدها د	ارد؟	
	۱) آسیلکوآ و هیدروژناز		۲) کارنی تین ترانسفراز II	
	۳) استیل کوآکربوکسیلاز		۴) اسید چرب سنتاز	
<u>زیست</u>	<i>تشناسي:</i>			
-41	كدام پروتئين نقش مهاري	در پروسه مرگ برنامهریزی	شده سلولها دارد؟	
	Bim ()	BCLr (r	Cyt C (*	Caspase 9 (*
-44	کدام مولکول در همانندسا	ازی جلوتر از بقیه حرکت می	کند؟	
	۱) نوكلثاز		DNA primase (Y	
	A polymerase III (*	DN	۴) هلیکاز	
-77	برای انتقال مواد و واکنشه	ها كدام اتصال مناسب است؟		
	Iemi Desmosome ()	H	Desmosome (7	
	Tight Junction (*		Gap Junction (*	
-44	كدام سيكلين، نقش تعيير	کننده در فاز S مهرهداران را	ا دارد؟	
	E(A (*	В (*	D (*
-40	در ساختمان تریپپتید گل	وتاتیون، کدام عنصر یافت مے	يشود؟	
	۱) گوگرد	۲) سديم	۳) منیزیم	۴) پتاسیم
-49	کدام ویروس از نظر اندازه	کوچکتر است؟		
	۱) ویروس برگ تنباکو		Φ_{X} \YF (Y	
			۴) باکتریوفاژ ۸	

-44	در کدام سلول هستک وج	بود <u>ندارد</u> ۲		
	۱) لوكوسيتها		۲) جلبکهای سبز ـ آب	
	۳) پروتوزوا		۴) متازوآ	
-44	کدامیک، نشانه بیان در ژر	نها است؟		
	۱) هتروکروماتین		۲) متيلاسيون هيستون	
	٣) استيلاسيون هيستون		۴) یوبی کوییتینه شدن	يستون
-٧٩	كدام آنزيم، تبديل فروكتو	ز ۱ و۶ بیس فسفات را به دی	هيدروكسي استوفسفات	جام مىدھد؟
	۱) انولاز		۲) فسفو فروكتوكيناز	
	٣) الدولاز		۴) هگزوکیناز	
-A•	كدام ژن انكوژن است؟			
	MYC (1	BRCA (Y	RB (r	Par (*
-41	کدامیک، از خواص کلوئید	ی است؟		
	۱) عدم حركت ذرات كلوئي	دی در محیط پراکنده کننده	۲) وجود بار الکتریکی ه	لايەھاى ذرات كلوئيدى
	۳) وجود سطح کم ذرات ک	لوئيدى	۴) نفوذ ذرات کلوئیدی	غشاى طبيعي
-47	کانال گلیکوفورین A چه ن	وع کانالی است؟		
	۱) ترشحی	۲) باز	٣) فعال	۴) غيرفعال
-82	آنتىكرها جزو كدام دسته	از پروتئینها هستند؟		
	۱) میوزینها	۲) گلیکوپروتئینها	٣) البومينها	۴) گلوبولینها
-14	سنتز پیریمیدنها از کدام	مولكول آغاز مىشود؟		
	۱) پرولین	۲) اسپارژین	۳) گلوتامات	۴) اسپارتات
-14	كدام لايه، مسئول توليد س	بلولهای کبدی است؟		
	۱) تروفواكتودرم	۲) اندودرم	۳) اکتودرم	۴) مزودرم
-18	در چرخه TCA در هنگاه	, تبديل مالات به اگزالواستات.	، كدام متابوليت توليد م	بود؟
	NADH (1	NAD (Y	CoASH (*	FADHY (*
-44	تعداد کلی ATP تولیدش	ده در مسیر اکسیداسیون کا	امل یک مولکول گلوکز	مسير شاتل مالات ـ آسپارتات
	كدام است؟			
	47 (1	TF (T	٣٨ (٣	۳۵ (۴
-44	فعالیت MPF در کدام مر	حله به حداکثر میرسد؟		
	۱) متافاز	S (T	Gr (r	۴) پروفاز
-49	سنتز PremRNA هنگاه	، رونویسی ژنهای سلولهای	يوكاريوتى بهوسيله كداه	ك انجام مىشود؟
	۱) RNA پلیمراز I بدون	استفاده از انرژی ATP		
	۳) RNA پلیمراز II بدور	ن استفاده از انرژی ATP	۴) RNA پلیمراز II ب	ستفاده از انرژی ATP
-9•	منشاء جنيني سلولهاي ك	لرومافيني مغز غده فوق كليه	کدام است؟	
	۱) مزودرم شکمی		۲) مزودرم پشتی	
	۳) لوله عصبی		۴) ستیغ عصبی	

-91	در میتوکندری انسان، ک	دامیک رمز پایانی است؟		
	AUA (1		AGG (T	
	UGA (*		CGA (*	
-97	تشکیل جنین از یک سا	ول پارانشیمی بهدلیل	سلولهای پارانشیمی اس	ت و رویان ایجادشده، .
	نامیده میشود. (از چپ	ه راست)		
	Somatic embryo (\	Totipotency-	-zygotic embryo (۲	Totipotenc
	somatic embryo (*	Differentiation-	-zygotic embryo (f	Differentiatio
-98	به نمونه مضاعف هولو تا	ب چه می گویند؟		
	۱) ئئوتايپ	۲) پاراتایپ	۳) ایزوتایپ	۴) تتراثایپ
-94	نوع پوشش فوليكولهاي	, غده تيروئيد كدام است؟		
	۱) مکعبی مطبّق	۲) سنگفرشی ساده	۳) استوانهای ساده	۴) مکعبی ساده
-90	خارجى ترين لايه پوشانن	ده یک فیبر عصبی میلین دار ه	حیطی کدام است؟	
	۱) میلین	۲) سلول شوان	٣) تيغه پايه	۴) اندونوريوم
-98	«Kinetoplast» در تاژ	کداران چیست؟		
	۱) DNA متراکم در در	بن یک میتوکندری	۲) DNA هستهای	
	۳) جسمک پایهای		۴) لایه نگهدارنده تاژک	
-97	کدام DNA پلیمراز یوک	ناریوتی، از خاصیت پرایمزی نی	ز برخوردار است؟	
	۱) اپسیلون	۲) گاما	٣) بتا	۴) آلفا
-91	پروتئینهای متحرک در	محل اتصال میکروتوبول به کر	وماتیدها (در کینه توکور) ک	ام است؟
	۱) اکتین و توبولین		۲) داینین و توبولین	
	۳) داینین و کاینزین		۴) توبولین و کاینزین	
-99	آنزيم گلوكز ۶ فسفاتاز ا	ز آنزیمهای شاخص کدام است	5	
	۱) غشای داخلی میتوکند	۰٫ری	۲) غشای شبکه اندوپلاسم	
	۳) غشای خارجی میتوک	درى	۴) سطح خارجی پلاسمالہ	
-1	کدامیک از انواع RNA [.]	۱ ها در اتصال دو جزء ریبوزوم	دخالت بیشتری دارد؟	
	ΔS (1	TAS (T	1AS (T	18s (f
شيمى	آلی و عمومی:			
-1-1	شمار اتمها در ۳ گرم کر	بن (C = ۱۲) با چند گرم منی	زیم (Mg = ۲۴) برابر است	
	74 (1	۶ (۲	۲ (۳	17 (4
-1+7	قدرت اسیدی کدام ترکی	ب بیشتر است؟		
	۱) استیک اسید	۲) مونوکلرواستیک اسید	۳) تری کلرواستیک اسید	۴) دیکلرو استیک ا
-1.5	اگر pH محلولی ۱۱ باشد	OH^- غلظت مولار يون، OH^- در	آن کدام است؟	
	10-4 (1	10-11 (7	10-x (T	10-Y (F

۱۰۴- فشار اسمزی محلول یک مولار کدام ترکیب، بیشتر است؟

') اتانول ۲) گلوکز ۳) گلیسرول ۴) سدیم کلرید	
گر $ m pH$ یک بافر، دو واحد بیشتر از $ m pK_a$ اسید مربوط باشد، نسبت غلظت نمک به اسید مربوطه، کدام است؟	-1+4
$\frac{1}{1}$ α $\frac{1}{2}$ α	
$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
نورمون انسولین دارای ۳/۴ درصد گوگرد است. وزن اتمی گوگرد ۳۲ و انسولین دارای ۶ اتم گوگرد است. وزن	-1.5
ولکولی انسولین چند گرم بر مول است؟	ła:
۵۶۵° (۱	
947 (1	
10/8 (
104/4 (
ر یک واکنش شیمیایی، غلظت ترکیب A در عرض ۲۳ دقیقه از ۳۵ ° / ° مول بر لیتر به ۲۸۵ ° / ° مول بر لیتر	-1.1
$^{\circ}$ شییر می $^{\circ}$ ند. سرعت واکنش برحسب $^{-1}$.min کدام است میکند. سرعت واکنش برحسب	
$-r/\Lambda r \times 10^{-4}$ (1)	
T/A×10-4 (
8,0×1°- (1	
$-\varepsilon_{1}\Delta\times1^{-r}$ (7)	
رای تهیهٔ ۱۰۰mL محلول ۲۵۰۰/۰ مولار سدیم هیدروکسید، چند میلیگرم از آن لازم است؟	-1•1
$(NaOH = f \circ g.mol^{-1})$ $f \circ (1)$	
T = (
Y = 0	
10 (
۰۰۰۰ ندام عنصر با عدد اتمی داده شده، در همهٔ ترکیبهای خود، یک فلز دو ظرفیتی است؟	
۲۲ (۴ ۲۰ (۳ ۲۴ (۲ ۲۶ (۲	
گر از واکنش فلز آلومینیم با هیدروکلریک اسید برای تهیهٔ گاز هیدروژن استفاده شود، برای تولید ۵ لیتر گاز	
نیدروژن، چند گرم آلومینیم لازم است؟ (حجم مولی گازها در شرایط آزمایش ۲۵L است. ۱-Al = ۲۷g.mol)	
۵٫۴ (۱	
T/F (1	
T/F (1	
4,7 (

۱) گالاکتوز

111- كدام گزينه نشان دهندهٔ يک مخلوط راسميک است؟

۱) مخلوط مساوی از فرم D و L یک ترکیب

۲) یک مخلوط از فرم L ترکیب و ایزومر چپگردان آن ترکیب

۳) یک مخلوط فرم D ترکیب و ایزومر چپگردان آن ترکیب

۴) یک مخلوط از ایزومر چپگردان نوریلاریزه و راست گردان آن

۱۱۲- در اثر احیای گلوکز با H_v در مجاورت نیکل، کدام ترکیب به دست می آید؟

۲) سوربیتول ۳) فروکتوز ۴) گلوکاریک اسید

۱۱۳- کدام ترکیب می تواند ایزومرهای R و S داشته باشد؟

$$CH_{\tau}$$
 CH_{τ}
 C

$$\begin{array}{c|c} CH_{\tau} & CH_{\tau} \\ \downarrow \\ Br - C - COOH \ \ (^{\epsilon} & CI - C - H \ \ (^{\tau} \\ \downarrow & H \end{array}$$

۱۱۴ - از ترکیب آمینهای نوع اول با کدام یک از ترکیبات زیر، مولکولی حاصل می شود که حاوی پیوند ایمین -۱۱۴ - (-N = C-)

١) آلدئيدها

٣) اسيدهاي آلي ۴) فنلها

۱۱۵ واکنش آیینه نقره برای شناسایی کدام دسته از مواد کاربرد دارد؟

۱) تیواسترها ۲) آلدئیدها

۳) الکلهای نوع اول ۴) اسیدهای کربوکسیلیک

118- محصول رنگی حاصل از واکنش نینهیدرین با یک آمینو اسید، دارای کدام قسمت از مولکول آمینو اسید است؟

۱) گروه ایمین ۲) نیتروژن آمینو

۳) گروه کربوکسیل ۴) نمک کربوکسیل

از اکسیداسیون الکل نوع دوم، کدام ماده بهدست می آید؟

۱) کربوکسیل ۲) آلدئید

۳) انیدرید ۴

۱۱۸ - در کدام مولکول، عدد اکسایش کربن متصل به اکسیژن بیشتر است؟

۱) اتانول ۲) متانول

۳) اسید استیک (۳

119- در مولکول زیر، کدام گروه شیمیایی وجود ندارد؟