



آزمون ۱۲ از ۱۳



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان  
سازمان سنجش آموزش کشور

# پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی سنجش دوازدهم - جامع سوم (۱۳۹۹/۰۳/۹)

## علوم تجربی (دوازدهم)

کارنامه آزمون، عصر روز برگزاری آن از طریق سایت اینترنتی زیر قابل مشاهده می‌باشد:

[www.sanjeshserv.ir](http://www.sanjeshserv.ir)

### مدیران، مشاوران و دبیران محترم دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی

به منظور فراهم نمودن زمینه ارتباط مستقیم مدیران، مشاوران و دبیران محترم دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی همکار در امر آزمون‌های آزمایشی سنجش و بهره‌مندی از نظرات ارزشمند شما عزیزان در خصوص این آزمون‌ها، آدرس پست الکترونیکی [test@sanjeshserv.com](mailto:test@sanjeshserv.com) معرفی می‌گردد. از شما عزیزان دعوت می‌شود، دیدگاه‌های ارزشمند خود را از طریق آدرس فوق با مدیر تولیدات علمی و آموزشی این مجموعه در میان بگذارید.



کanal تلگرام آزمون‌های آزمایشی سنجش @sanjesheducationgroup

## فارسی و نگارش

۱. گزینه ۳ درست است.  
واژگان فارسی دهم
۲. گزینه ۱ درست است.  
گزینه ۲ درست است.
- در این گزینه دستوری به معنای وزارت و در گزینه های دیگر به معنی اجازه است. (فارسی یازدهم، صفحه ۱۱۰)
۴. گزینه ۴ درست است.  
واژه نامه فارسی یازدهم
۵. گزینه ۲ درست است.
- هول: هول / هلیه: هلیه. در گزینه یک محظوظ و محدود و در گزینه ۴ جناغ و جناق هر دو درست است.
۶. گزینه ۳ درست است.  
عنابت: انبات // الا: علا // سبحانه: سبحانه
۷. گزینه ۴ درست است.  
درس قصه عینکم
۸. گزینه ۱ درست است.
۹. گزینه ۳ درست است.
- واژه های فرخار و فغفور جزو واژگان متروک زبان فارسی هستند. بررسی سایر گزینه ها: منشور: نامه، هوش: مرگ، پرستار: فرمانبردار، در گذر زمان دچار تحول معنایی شده اند.
۱۰. گزینه ۲ درست است.
۱۱. عتیب ممال شده عتاب است. (فارسی دهم، صفحه ۱۰۰)  
گزینه ۴ درست است.
- در این بیت به ویژگی قومی و ملی حمامه پرداخته شده، در حالیکه سایر گزینه ها در بردارنده حوادث خارق العاده است؛ بیت دوم: چهره ازدها، بیت سوم اشاره به سیمرغ، بیت چهارم عمر طولانی. (فارسی دهم، صفحه ۱۰۸)
۱۲. گزینه ۳ درست است.
۱۳. گزینه ۲ درست است.
- در این گزینه گیلان جمع گیل است. در سایر گزینه ها به معنای محل است. (فارسی دهم، صفحه ۸۰)
۱۴. گزینه ۱ درست است.
- در غرقابای افتادیم "تا" که (چه کسی) آشنا(شنا) دارد، حرف ربط تا دو جمله را بهم مرتبط ساخته است. (فارسی دهم، صفحه ۸)
۱۵. گزینه ۳ درست است.
- در گزینه شماره ۳ "ا" نشانه تحسین است. گزینه های ۲ و ۴ نشانه منادا ساز است. در گزینه ۱ ساقی منادا است. توضیحات مربوط به منادا در (فارسی دهم، صفحه ۱۴۳)
۱۶. گزینه ۴ درست است.
- نهاد در قسمت دوم کراحتیت است. بررسی سایر گزینه ها: در افعال مخصوص گشت / مصروف گردانید / به دست آورد، شناسه "م" به قرینه فعل قبلی حذف شده است. توضیحات مربوط به شناسه (فارسی یازدهم، صفحه ۱۱۹)
۱۷. گزینه ۲ درست است.
- بررسی سایر گزینه ها: گزینه ۴: تکرار یار آمده، گزینه ۱: رنج و عنا معطوف، گزینه ۳: شیخ محترم بدل از بوسیعید مهنه است.
۱۸. گزینه ۱ درست است.
- گزینه ۱: بند: بند + ۵ ، بررسی سایر گزینه ها: نال + سنده / گشای + سنده / پر + سنده (بن مضارع + سنده)

۱۹. گزینه ۴ درست است.

(فارسی دهم، صفحه ۳۸)

۲۰. گزینه ۱ درست است.

موضوعات مرتبط با ادبیات مقاومت در (فارسی دهم، صفحه ۷۳)

۲۱. گزینه ۲ درست است.

(فارسی دوازدهم، صفحه ۲۳)

۲۲. گزینه ۳ درست است.

هر دو سرو به کار رفته در بیت به معنی درخت سرو است (فارسی دهم، صفحه ۱۴)

۲۳. گزینه ۴ درست است.

شبکه‌های معنایی (زمان: پریر، دی، امروز، فرد؛ مکان: مرو، بلخ، نشاپور، هری؛ گل‌ها: لاله، نیلوفر، گل، سمن؛ عناصر اربعه:

آتش، آب، خاک، باد)

۲۴. گزینه ۲ درست است.

با توجه به اینکه در حکایت آمده هیچ چیزت آرزو می‌کند؟/ چه خواسته‌ای داری؟ مناسب‌ترین پاسخ گزینه ۲ است. (فارسی

دوازدهم، صفحه ۴۷)

۲۵. گزینه ۱ درست است.

## عربی، زبان قرآن

۲۶. گزینه ۱ درست است.

در سایر گزینه‌ها «ترجع»، «النتیجة» و... به درستی ترجمه نشده است.

۲۷. گزینه ۲ درست است.

در سایر گزینه‌ها «لغّی»، «أَنْ تَقَاهُمْ» و... به درستی ترجمه نشده است.

۲۸. گزینه ۳ درست است.

در سایر گزینه‌ها «قد سمی»، «السورة» و... به درستی ترجمه نشده است.

۲۹. گزینه ۴ درست است.

در سایر گزینه‌ها «من قُل»، «سلطاناً» و... به درستی ترجمه نشده است.

۳۰. گزینه ۳ درست است.

ترجمه گزینه: از دانه است که درخت رشد می‌کند. با این گزینه مفهوم هماهنگی دارد.

۳۱. گزینه ۲ درست است.

در سایر گزینه‌ها «تعلّمت»، «كانت تلقى» و... به درستی ترجمه نشده است.

۳۲. گزینه ۱ درست است.

در سایر گزینه‌ها «گازهای آلوده کننده»، «بیماری‌های بسیاری» و... به درستی ترجمه نشده است.

۳۳. گزینه ۴ درست است.

در سایر گزینه‌ها «دانش‌آموز کوشَا»، «با توکل» و... به درستی ترجمه نشده است.

۳۴. گزینه ۱ درست است.

ترجمه گزینه: مضمون کتاب کلیله و دمنه با داستان‌های دیگر فرق می‌کند و تشابهی را میان آن دو نمی‌بینیم. این عبارت نادرست است.

۳۵. گزینه ۳ درست است.

ترجمه گزینه: متن در مورد ویژگی‌های کتاب کلیله و دمنه و محتوای آن است.

۳۶. گزینه ۲ درست است.

ترجمه گزینه: کلیله و دمنه کتابی ترجمه شده از پهلوی به عربی است.

۳۷. گزینه ۳ درست است.

ترجمه گزینه: عبدالله بن مقفع یک مترجم در قرن دوم بود.

۳۸. گزینه ۴ درست است.

۳۹. گزینه ۱ درست است.

۴۰. گزینه ۲ درست است.

۴۱. گزینه ۳ درست است.

ترجمه گزینه: روز ششم از روزهای هفته، روز پنجشنبه است.

۴۲. گزینه ۲ درست است.

ترجمه گزینه: زن مسلمان در شب قدر نخوابید و لبریز شد تا سپیدهدم. این عبارت نادرست است.

۴۳. گزینه ۴ درست است.

با توجه به مذکور بودن فعل جمله، «النساء» نمی‌تواند در جای خالی قرار گیرد.

۴۴. گزینه ۱ درست است.

«ن» در این گزینه، نون وقايه نیست.

۴۵. گزینه ۳ درست است.

«منظراً» اسم مکان و «أجمل» اسم تفضیل است.

۴۶. گزینه ۴ درست است.

«تبتعدون» نادرست است؛ زیرا جواب شرط بوده و باید به صورت مجزوم بیاید.

۴۷. گزینه ۲ درست است.

تنها این گزینه از نظر قواعد صحیح است.

۴۸. گزینه ۱ درست است.

«لا» نفی جنس بر سر اسم «نجاح» آمده است.

۴۹. گزینه ۴ درست است.

«اجتناباً» مفعول مطلق تاکیدی است.

۵۰. گزینه ۳ درست است.

حرکت‌گذاری کامل عبارت به این شکل است:

ٌ ظَاهِرٌ ظَاهِرٌ «قوس قرح» مع الْوَانِهَا الْجَمِيلَةِ فِي الْأَيَّامِ الْمَاطِرِ

## فرهنگ و معارف اسلامی

۵۱. گزینه ۴ درست است.

رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او فقط با گام برداشتن به سوی این هدف میسر می‌شود. اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان است؛ یعنی شناخت سرمایه‌ها، حرکت انسان، توانایی‌ها و استعدادهای او و چگونگی به کارگیری این سرمایه‌ها و همچنین شناخت موانع مقابله یا اجتناب از این موانع در مسیر تقرب به خداوند و نحوه به همین دلیل است که خودشناسی سودمندترین دانش‌ها شمرده شده است.

۵۲. گزینه ۱ درست است.

آنها هنگامی که مردم را به نماز فرا می‌خوانید، آن را به مسخره و بازی می‌گیرند؛ این به خاطر آن است که آنها گروهی هستند که تعقل نمی‌کنند.

۵۲. گزینه ۲ درست است.

روایت امام علی (ع) از کتاب علم‌الیقین فیض کاشانی او سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد. از این‌رو هرکس در خود می‌نگرد و یا به تماشای جهان می‌نشیند، خدا را می‌یابد و محبتش را در دل احساس می‌کند.

۵۳. گزینه ۴ درست است.

منظور هاتف این بوده که گنجی که سال‌ها به دنبال آن بوده است در درون خودش می‌باشد. از کلام مولوی

۵۴. گزینه ۳ درست است.

میل سرکشی که در درون انسان دنیابی، به گناه دعوت می‌کند و از پیروی از عقل و وجدان بازمی‌دارد یعنی فرمان دهنده به بدی‌ها نامیده می‌شود. طغیان می‌کند و وی را به گناه فرامی‌خواند، این عامل درونی همان است که حضرت علی درباره اش فرموده است: دشمن‌ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.

۵۵. گزینه ۲ درست است.

بحث امکان و وحدت معاد این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان‌ها را ندارد. به عنوان نمونه، چگونه می‌توان پاداش بسیاری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا را در این دنیا داد؟ و یا چگونه می‌توان در این جهان کسی را که به هزاران نفر ستم روا داشته و یا صدها نفر را قتل عام کرده است، کیفر داد؟ به عنوان مثال اعدام کسی چون صدام و حامیان وی به هیچ عنوان با جرم شهید کردن صد ها هزار انسان بی‌گناه، و معلول و شیمیابی کردن هزاران جانباز برابری نمی‌کند.

۵۶. گزینه ۱ درست است.

امام کاظم(ع) در جواب برادرش که پرسید: «دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟ فرمود: چهره و دست تا مج».

۵۷. گزینه ۴ درست است.

«روزه و تقویت تقوا»

۵۸. گزینه ۳ درست است.

«مشکلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رسول خدا(ص)»

۵۹. گزینه ۱ درست است.

امام پس از بیان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار به آنها فرمود: «در آن شرایط، در صورتی می‌توانید راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا پشت‌کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید و وقتی می‌توانید به عهد خود با قرآن وفادار بمانید که پیمان‌شکنان را تشخیص دهید؛ و آن‌گاه می‌توانید پیرو قرآن باشید که فراموش‌کنندگان قرآن را بشناسید».

۶۰. گزینه ۲ درست است.

به علت عدم توجه مسلمانان به هشدارهای امیرالمؤمنین حضرت علی، آنچه آن امام پیش بینی می‌کرد، به وقوع پیوست؛ بنی-امیه بر مردم حاکم شدند و دنیای اسلام را تا حد زیادی به دوران جاهلیت بازگرداندند. با وجود این شرایط سخت و بحرانی، ائمه به شکل‌های گوناگون با این حاکمان مبارزه کردند و در مقابل تفسیرهای غلط از اسلام و تحریف دین ایستادند و آموزه‌های قرآن و سخنان واقعی پیامبر را در اختیار جامعه قرار دادند.

۶۱. گزینه ۳ درست است.

محبت باید همراه با معرفت باشد.

۶۲. گزینه ۴ درست است.

خداآوند آخرین ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید و از غیبت ادامه یابد و تا فراهم آمدن شرایط برای تشكیل حکومت جهانی از نظرها پنهان باشد. این پس پرده انسانی شایستگی درک ظهور و بهره‌مندی غیبت آن‌قدر ادامه می‌یابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعه کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند.

۶۳. گزینه ۲ درست است.

«چگونگی امامت حضرت مهدی در عصر غیبت»

۶۴. گزینه ۱ درست است.

«وَنُرِيدُ أَنْ تَمُّنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَ تَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ»

۶۶. گزینه ۳ درست است.

ما مسلمانان نیز مانند پیروان سایر ادیان الهی عقیده داریم که در آخرالزمان منجی انسان‌ها، ظهور خواهد کرد و جهان را به نهایت عدل خواهد رساند. این منجی، امام مهدی است که از نسل پیامبر اکرم(ص) می‌باشد.

۶۷. گزینه ۴ درست است.

در زمان ائمه، مردمانی در شهرهای دوردست بودند که به امامان دسترسی نداشتند و نمی‌توانستند احکام دین را از ایشان بشنوند و از فرمان‌های آنان مطلع شوند. از این‌رو، آن بزرگواران دانشمندانی را که توان دستیابی به معارف و احکام دین را داشتند، برای رفتن به نقاط مختلف شهر تربیت می‌کردند که در شهر خود و یا شهرهای دیگر می‌رفتند و احکام اسلام را به مردم می‌آموختند. اگر مردم نیز پرسشی داشتند، آنان براساس دانشی که از قرآن کریم و روایات داشتند، به آن پرسش پاسخ می‌دادند

۶۸. گزینه ۱ درست است.

«نیازمندی جهان به خدا در پیدایش»

۶۹. گزینه ۲ درست است.

راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او: نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاری جستن از او برای رسیدن به اخلاص، غفلت از خداوند را کم می‌کند، محبت او را در قلب تقویت می‌سازد و انسان را از کمک‌های الهی بهره‌مند می‌نماید.

۷۰. گزینه ۳ درست است.

از آنجا که خداوند تنها خالق جهان است پس تنها مالک آن نیز هست؛ مالکی در توحید زیرا هر کس که چیزی را پدید می‌آورد، مالک آن است.

۷۱. گزینه ۴ درست است.

اعتقاد به اینکه علاوه بر خداوند و در کنار او دیگرانی نیز هستند که تدبیر ربوی در شرک الهی، برای خود یا سایر مخلوقات حساب امور موجودات را برعهده دارند. اگر کسی در کنار ربوی جداگانه باز کند و گمان کند که کسی می‌تواند مستقل از خداوند، امور را تدبیر کند گرفتار شرک شده است.

۷۲. گزینه ۱ درست است.

درخواست از اولیای الهی برای اجابت خواسته‌ها منافاتی با توحید ندارد.

۷۳. گزینه ۴ درست است.

«اخلاص در بندگی»

۷۴. گزینه ۱ درست است.

«راه‌های تقویت اخلاق»

۷۵. گزینه ۳ درست است.

«میوه‌های درخت اخلاق»

## معارف و اقلیت‌های دینی

۵۱. گزینه ۴ درست است.

منظور از آفاق عینی یعنی «عالیم برون» و منظور از آنفس یعنی «عالیم درون» که گستردۀ و دلنشیں بودن از ویژگی‌های آن‌ها است.

۵۲. گزینه ۱ درست است.

بی‌نهایت‌طلبی در انسان فطری است.

۵۳. گزینه ۲ درست است.

نقش خداوند، جایگاه «ضرورت وجود» را پیدا می‌کند.

۵۴. گزینه ۴ درست است.

ایمان از سرچشمۀ‌های عمل صالح است.

۵۵. گزینه ۳ درست است.

انسان برای رسیدن به کمال وجودی خویش، نیازمند سرمشق و الگو است.

۵۶. گزینه ۲ درست است.

کاربرد برهان نظم این است که طبیعت، مدیر و مدبری حکیم دارد.

۵۷. گزینه ۱ درست است.

امیال غریزی و مادی، همراه با گرایش‌های «الهی» و «معنوی» در انسان وجود دارد.

۵۸. گزینه ۴ درست است.

دلیلی که بر این ادعای خود می‌آورند این است که چون خدا را نمی‌توان با حواس خود «کشف» و «دریافت نمود»، لذا خدا وجود ندارد.

۵۹. گزینه ۳ درست است.

عمل همراه با ایمان راستین می‌تواند ارزشمند شود.

۶۰. گزینه ۱ درست است.

مشاهده مستقیم نامیده می‌شود و مشاهده در آن نقش اساسی دارد.

۶۱. گزینه ۲ درست است.

تا وقتی خود را به درستی نشناخته باشیم، نمی‌دانیم چه چیزی برای ما مفید می‌باشد و چه چیزی زیان‌آور است.

۶۲. گزینه ۳ درست است.

بر اساس «کنجکاوی» و «حس علت‌یابی» صورت می‌گیرد.

۶۳. گزینه ۴ درست است.

نقص مطلق را به وجود می‌آورد.

۶۴. گزینه ۲ درست است.

بيانگر داشتن علم و نداشتن التزام به آن است.

۶۵. گزینه ۱ درست است.

با توجه به بیت «ای شهان کشتیم ما خصم برون / ماند خصمی زان بتر اندر درون» مکاتب بشری قادر نیستند انسان را بر ضد حیوانیت خویش بشورانند.

۶۶. گزینه ۳ درست است.

زمانی که برنامه‌ریزی انسان با کاهش و افزایش، آگاهی و شناخت همراه باشد، دستخوش تغییر و دگرگونی می‌گردد.

۶۷. گزینه ۴ درست است.

در مقابل در برانگیختن علیه حیوانیت خویش قادر و توانمند نیستند.

۶۸. گزینه ۱ درست است.

آن‌هایی غافل هستند که معتقدند علم به تنها‌یی قادر به حل تمامی مسائل انسان است.

۶۹. گزینه ۲ درست است.

با بیت «تا بدان جا رسید دانش من / که بدانم همی که نادانم»، مصدق معنایی و مفهومی دارد.

۷۰. گزینه ۳ درست است.

اخلاص شدت خودخواهی‌ها را پایین می‌آورد و انسان را از چنگال نفس حیوانی رها می‌سازد.

۷۱. گزینه ۴ درست است.

مطالعات علوم تجربی فقط در حوزه‌های طبیعت فیزیکی و مادی است.

۷۲. گزینه ۱ درست است.

رابطه‌ای است که انسان را به عالم الهی و قدسی متصل می‌کند و خود حقیقی نامیده می‌شود.

۷۲. گزینه ۴ درست است.

بر اساس قانون مندی هستی و سنت‌های حاکم در جهان خلقت، انسان دارای قدرت انتخاب می‌باشد و به وسیله همین قدرت انتخاب معنی پیدا می‌کند.

۷۳. گزینه ۱ درست است.

روح با شخصیت حقیقی که تابع قوانین عالم ماده نمی‌باشد و جاودانه است، حیات دیگر را در جهان دیگر آغاز می‌نماید.

۷۴. گزینه ۳ درست است.

این نوع انسان‌ها در واقع از خود می‌ترسند که مبادا به علت قصور و خطای خویش از فیض و رحمت او بی‌نصیب باشند.

### زبان انگلیسی

۷۵. گزینه ۱ درست است.

در ابتدای جمله فعل به صورت مصدر با **to** یا **ing** به کار می‌رود و در نقش فاعل مفرد می‌باشد. بنابراین جمله گزینه ۱ در دو قسمت اشتباه می‌باشد. فعل بدون **to** در اول جمله و همچنین فعل **are** اشتباه می‌باشد.

**To + فعل**  

$$\frac{\text{ فعل}}{\text{To} + \text{ فعل}} + \dots + \text{ فعل مفرد} + \dots + \text{ فعل}$$

علاوه بر این ساختار **It** به همراه **be** به قرار است.

**It + be + فعل + to + (اسم شخص یا ضمیر مفعولی + صفت for + اسم مفعول فعل اصلی یا ضمیر مفعولی + فعل)**

۷۶. گزینه ۳ درست است.

جمله دوم بصورت مجھول آینده می‌باشد و ضمیر **It** همان **the letter** است. مجھول آینده با افعال کمکی به قرار زیر است:  
**will**

**can + مفعول + be + p.p..... + اسم مفعول فعل اصلی یا p.p.....**  
**may**  
**must**

۷۷. گزینه ۲ درست است.

جمله شرطی نوع دوم است. زیرا جمله شرط یا همان جمله بعد از **if** بصورت گذشته ساده می‌باشد. بنابراین جمله نتیجه یا جواب شرط باید بصورت آینده در گذشته باشد. ساختار آن به قرار زیر می‌باشد.

**فعل گذشته ساده + فعل اصلی ساده + if + فعل اصلی ساده + فعل**

جمله نتیجه یا جواب شرط

جمله شرط یا شرط جمله

۷۸. گزینه ۳ درست است.

جمله به صورت یک جمله‌واره توصیفی می‌باشد و همچنین جمله حالت مفعولی دارد. کلمه ربطی **that** یا **whom** به صورت مفعولی بکار می‌رود. بنابراین مفعول نباید بعد از فعل، یعنی همان (**him**) تکرار شود.

**فعل + فعل + whom / that + اسم انسان**

گزینه ۴ کاملاً اشتباه می‌باشد و برای کوتاه کردن جمله نباید کلمه ربطی **that** آورده شود.

۷۹. گزینه ۴ درست است.

دیروز در تهران ترافیک بسیار زیادی وجود داشت و همچنین هوا به شدت بارانی بود. بنابراین ما دو ساعت با تأخیر به مقصدمان رسیدیم.

(۱) آمادگی، تهیه

(۲) مشاهده

(۳) انتظار، توقع

(۴) مقصد

۸۰. گزینه ۱ درست است.

یک منطقه بزرگی از زمین که در آن جا هوا در طی روز همیشه خیلی خشک و داغ است. در آن جا تعداد خیلی کمی گیاه یا درخت وجود دارد و همچنین مقدار زیادی شن و آب خیلی کمی وجود دارد که یک بیابان نامیده می‌شود.

۸۱. گزینه ۱ درست است.

- (۱) بیابان، صحراء  
 (۲) دشت، جلگه  
 (۳) جنگل  
 (۴) دامنه، وسعت، ناحیه
۸۲. گزینه ۲ درست است.  
 خواستم بدانم چرا رضا به نظر می‌رسید که خوشحال نبود با وجود این که شرایط یا وضعیت جسمانی او بهبود یافته بود.  
 (۱) علاوه بر (۲) با وجود این که، علیرغم (۳) از طریق (۴) بهوسیله
۸۳. گزینه ۳ درست است.  
 فیلم جالبی در سینما بود و مردم زیادی، از کودکان تا افراد مسن گرفته یا شامل می‌شد که آن را تماشا می‌کردند.  
 (۱) قدردانی کردن (۲) تأمین کردن (۳) در برداشتن، به نظم و ترتیب قرار دادن (۴) خدمت کردن، پذیرایی کردن
۸۴. گزینه ۴ درست است.  
 ایران کشور بزرگی است و انواع سنت‌های مختلف از قبیل موسیقی، آشپزی، کشتی و غیره دارد. این سنت‌ها به عنوان میراث و فرهنگ ما شناخته می‌شوند.  
 (۱) ترکیب (۲) دانش (۳) محافظت (۴) میراث
۸۵. گزینه ۱ درست است.  
 علی خیلی صمیمی و مهربان است و بسیار زیاد او را دوست دارد. بنابراین ما معمولاً از طریق تلفن یا ایمیل با همدیگر در ارتباط هستیم.  
 (۱) ارتباط، تماس (۲) ترتیب، قول و قرار (۳) بیان، اظهار (۴) هیجان
۸۶. گزینه ۲ درست است.  
 باید تلاش کنیم در محیط زیستی که زندگی می‌کنیم محافظت نماییم. زیرا کودکان و نوه‌های ما همجنین به آن احتیاج دارند.  
 (۱) در برداشتن، شامل بودن (۲) محافظت کردن (۳) جلوگیری کردن (۴) فراهم کردن، تأمین کردن
۸۷. گزینه ۴ درست است.  
 انواع مختلف زیادی فرهنگ لغت از قبیل فرهنگ لغات عمومی، فرهنگ لغات فنی یا تخصصی، فرهنگ‌های مصور و غیره وجود دارند.  
 (۱) بعلوه (۲) بوسیله (۳) در عوض، بجای (۴) از قبیل، نظیر، برای مثال
- (Cloze Test)
۸۸. گزینه ۳ درست است.  
 (۱) نگهداری کردن (۲) حمل کردن (۳) رسانیدن (۴) کار کردن، تلاش کردن
۸۹. گزینه ۲ درست است.  
 (۱) پوست (۲) عصب (۳) قلب (۴) حافظه
۹۰. گزینه ۴ درست است.  
 (۱) دویدن، اجرا کردن، راه انداختن (۲) بدست آوردن (۳) حرکت کردن، جایه‌جا شدن (۴) طول کشیدن، نیاز داشتن، گرفتن
۹۱. گزینه ۱ درست است.  
 (۱) حل کردن (۲) دادن، ارائه دادن (۳) صحبت کردن (۴) پاسخ دادن
۹۲. گزینه ۲ درست است.  
 درک مطلب (۱) سریعاً (۲) بطور مناسب (۳) بطور مصنوعی

۹۲. گزینه ۴ درست است.

طبق متن، یادگیری زبان در مدرسه به زمان طولانی نیاز است.

۹۳. گزینه ۳ درست است.

متن به ما می‌گوید که بعضی مردم پول کافی ندارند تا به خارج (کشور خارجه) بروند تا زبان را خیلی خوب یاد بگیرند.

۹۴. گزینه ۱ درست است.

از این متن می‌فهمیم که یادگیری یک زبان با کمک یک معلم خوب می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.

۹۵. گزینه ۴ درست است.

کارشناسان (متخصصان) معمولاً احتیاج دارند یک زبان خارجه را یاد بگیرند تا دانش خودشان را از آن زبان که در حیطه کارشان استفاده می‌شود، افزایش دهند.

۹۶. گزینه ۱ درست است.

بهترین عنوان برای متن چیست؟

(۲) ریز موج‌ها و امواج رادیویی

(۴) ماهواره ارتباطی یا مخابراتی

(۱) ریز موج‌ها (میکرو ویوها)

(۳) ایستگاه‌های میکرو ویو

۹۷. گزینه ۲ درست است.

مشکل عمدۀ ریز موج‌ها (میکرو ویوها) این است که آن‌ها فقط در مسیر راست یا مستقیم حرکت می‌کنند.

۹۸. گزینه ۳ درست است.

ارتباط‌های خارجی (برون‌مرزی) بوسیله ..... تأمین می‌شود.

ایستگاه‌های میکرو ویو از طریق فضا

۹۹. گزینه ۴ درست است.

فرق بین ریز موج‌ها (میکرو ویوها) و امواج رادیویی این است که میکرو ویوها.....

برای ارتباط (مخابرات) می‌توانند بسیار زیاد مناسب باشند.

### زمین‌شناسی

۱۰۱. گزینه ۱ درست است.

اگر نفت و گاز در مسیر مهاجرت خود، به لایه‌ای از سنگ‌های نفوذناپذیر مانند سنگ گچ برسند، قادر به ادامه مهاجرت نخواهند بود. این لایه نفوذ ناپذیر را پوش سنگ گویند.

۱۰۲. گزینه ۳ درست است.

در کیهان، صدها میلیارد کهکشان وجود دارد. کهکشان‌ها از تعدادی زیاد ستاره، سیاره و فضای بین ستاره‌ای (اغلب گاز و گرد و غبار) تشکیل شده‌اند که تحت تأثیر گرانش متقابل، یکدیگر را نگه داشته‌اند.

۱۰۳. گزینه ۴ درست است.

به علت انحراف محور زمین، زوایای تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی نیز در طول سال تفاوت دارد. این تفاوت زاویه، سبب ایجاد فصل‌ها در نقاط مختلف کره زمین شده است.

۱۰۴. گزینه ۲ درست است.

بارش‌های جوی در تأمین این منابع (آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی)، نقش اساسی دارند.

۱۰۵. گزینه ۱ درست است.

عناصر جزئی در پوسته به مقدار بسیار کم یافت می‌شوند. این عناصر، گاهی در بدن به عنوان عنصر اساسی و مورد نیاز و گاهی به عنوان سمی محسوب می‌شوند که باعث ایجاد عوارض و یا بیماری می‌گردند، مثل عنصر روی.

۱۰۶. گزینه ۳ درست است.

کانون زمین لرژه عبارت است از محلی درون زمین که انرژی ذخیره شده، از آن جا آزاد می‌شود.

۱۰۷. گزینه ۲ درست است.

پیشینیان ما، تجربه زیادی در بهره‌برداری مس، آهن، طلا، سرب و روی داشته‌اند و استخراج فلزات برای اولین بار در فلات ایران و فلات آناتولی ترکیه صورت گرفت.

۱۰۸. گزینه ۴ درست است.

طبق شکل ۱-۲ کتاب درسی، اگر زمین در مرکز عالم قرار بگیرد و ماه که به دور آن می‌چرخد، به ترتیب عطارد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری و زحل قرار می‌گیرند.

۱۰۹. گزینه ۳ درست است.

در مرحله بسته شدن، ورقه اقیانوسی از حاشیه به زیر ورقه قاره‌ای مجاور خود فرو رانده می‌شود (دراز گودال اقیانوسی) و با ادامه فروزانش در نهایت اقیانوس بسته می‌شود. (مانند بسته شدن اقیانوس تیتس) این مرحله مانع وسیع شدن سطح پوسته‌ای زمین می‌شود.

۱۱۰. گزینه ۲ درست است.

فراوان ترین ترکیب پوسته زمین، فلدسپارهای پلاژیوکلаз است. ضمناً بهتر است بدانید که گالن، سولفید سرب بوده و مگنتیت نوعی اکسید آهن می‌باشد.

۱۱۱. گزینه ۱ درست است.

فرایندهای دگرگونی، آذرین و مناطق زمین گرمایی، توسط پترولوزیست‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۱۱۲. گزینه ۴ درست است.

میزان نفوذپذیری خاک به میزان ارتباط و اندازه منافذ بستگی دارد. نفوذپذیری، نشانگر توانایی آبخوان در انتقال و هدایت آب می‌باشد.

۱۱۳. گزینه ۳ درست است.

این شکل معرف فرونژیست تدریجی زمین است و کلاً پدید فرونژیست حاصل بیلان منفی آب زیرزمینی است.

۱۱۴. گزینه ۲ درست است.

$$Q = \frac{V}{t} \Rightarrow Q = \frac{2200}{110} = 20 \text{ L/S}$$

۱۱۵. گزینه ۳ درست است.

پیدایش خندق‌ها (فرسايش آبي) باعث تخریب پل‌ها و جاده می‌شود. در اغلب این شرایط، می‌توان با ساخت کانال و ایجاد پوشش گیاهی، انرژی جریان آب را کاهش داد.

۱۱۶. گزینه ۴ درست است.

در ایجاد یک ناویس، تنش فشاری مؤثر بوده است. توجه کنید که سطح زمین فرسایش را نمایش می‌دهد که ربطی به تنش‌ها ندارد.

۱۱۷. گزینه ۱ درست است.

یکی از خطراتی که سازه‌ها را در مناطق شیبدار کوهستانی تهدید می‌کند، خطر ریزش کوه و سقوط مواد در دامنه‌های پرشیب است. ریزش کوه و مسدود شدن خطوط ریلی کوهستانی با اقداماتی مانند ایجاد انواع دیوار حائل، زهکشی برای تخلیه آب اضافی، ایجاد پوشش گیاهی و میخ‌کوبی و دیوار سنگی با تورهای سیمی، دامنه‌ها را پایدار می‌کنند. سطح ایستابی در سازه زیرزمینی اهمیت پیدا می‌کند.

۱۱۸. گزینه ۳ درست است.

در بخش زیر اساس از شن و ماسه یا سنگ شکسته استفاده می‌شود و در بخش بالایی آسفالت موجود است که شن و ماسه و قیر است.

۱۱۹. گزینه ۲ درست است.

بخش شمالی ایالات متحده، معروف به کمریند گواتر شد، زیرا پس از عصر یخ‌بندان، با آب شدن یخ‌ها حجم زیادی آب در خاک نفوذ کرد و نمک‌های بسیار انحلال‌پذیر ید را با خود شست و خاک‌های فقیر از ید را بر جای گذاشت و بیماری گواتر شایع شد.

۱۲۰. گزینه ۱ درست است.

سطح گسل، شکستگی و جابه‌جایی در آن اتفاق افتاده است. اگر سطح گسل مایل باشد، به طبقات روی سطح گسل فرا دیواره و به طبقات زیر سطح گسل، فرو دیواره می‌گویند. در ضمن حرکت ورقه‌های سنگ کره می‌تواند درز و گسل ایجاد کند.

۱۲۱. گزینه ۴ درست است.

در مقایسه سرعت امواج لرزه‌ای نسبت به یکدیگر می‌توان گفت، سرعت موج  $R < L < S < P$

۱۲۲. گزینه ۱ درست است.

بعد از وقوع زمین لرزه در صورت آسیب‌دیدگی سیم‌های برق، کنتور برق را باید قطع کرد.

۱۲۳. گزینه ۲ درست است.

طبق شکل ۷-۵، گسل درونه و ترود هم‌راستا هستند.

۱۲۴. گزینه ۳ درست است.

با توجه به ستون رویداد زیستی می‌توان گفت: اولین خزنه، دوره کربنیفر، دوران پالئوزوییک، ائون فانروزوییک اولین پرنده، دوره ژوراسیک، دوران مزوزوییک، ائون فانروزوییک (خطا دو مورد دارد: دوران فانروزوییک، ائون مزوزوییک)

۱۲۵. گزینه ۴ درست است.

اگر گسلی معکوس باشد، فرا دیواره نسبت به فرو دیواره به سمت بالا یا فرو دیواره به سمت پایین حرکت کرده است. پس A در فرا دیواره، لایه‌ای تیره‌رنگ است که می‌تواند با لایه E همسن باشد.

## ریاضی

۱۲۶. گزینه ۱ درست است.

نمودار مربوط به  $f(x) = |x| - [x]$  می‌باشد زیرا:

$$-1 \leq x < 0 \rightarrow \begin{cases} [x] = -1 \\ |x| = -x \end{cases} \Rightarrow y = -x + 1 ; \begin{array}{c|cc} x & -1 & 0 \\ \hline y & 2 & 1 \\ \text{نواحی توپر} & & \end{array}$$

$$0 \leq x < 1 \rightarrow \begin{cases} [x] = 0 \\ |x| = x \end{cases} \Rightarrow y = x ; \begin{array}{c|cc} x & 0 & 1 \\ \hline y & 0 & 1 \\ \text{نواحی توپر} & & \end{array}$$

$$x = 1 \rightarrow y = 0$$

۱۲۷. گزینه ۴ درست است.

$$x^2 - \sqrt{17}x + 9 = 0 \quad \begin{cases} \alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \sqrt{17} = s \\ \alpha \cdot \beta = \frac{c}{a} = 9 = p \end{cases}$$

$$(\alpha - \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = s^2 - 4p = (\sqrt{17})^2 - 4(9) = 17 - 36 = -19$$

۱۲۸. گزینه ۲ درست است.

$$\left. \begin{array}{l} PM || NB \xrightarrow{\text{تالس}} \frac{1}{3} = \frac{AM}{MB} \\ MN || BC \xrightarrow{\text{تالس}} \frac{1+3}{x} = \frac{AM}{MB} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{4}{x} \quad \boxed{x = 12}$$

$$\Delta AMN \sim \Delta ABC \Rightarrow \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \Rightarrow \frac{4}{16} = \frac{MN}{BC} \quad \boxed{\frac{BC}{MN} = 4}$$

۱۲۹. گزینه ۴ درست است.

ابتدا معادله رادیکالی را حل می کنیم:

$$\sqrt{x+1} = 1 + \sqrt{2x-5}$$

دو طرف به توان ۲

$$x+1 = 1 + 2x - 5 + 2\sqrt{2x-5}$$

$$5-x = 2\sqrt{2x-5} \xrightarrow{\text{به توان ۲}} x^2 - 18x + 45 = 0$$

$$(x-15)(x-3) = 0 \quad \boxed{x = 3}$$

↓

$$x = 15 \quad \text{غیرق}$$

اکنون  $x = 3$  را برابر طول رأس سهمی قرار می دهیم:

$$f(x) = -x^2 + kx + \lambda \rightarrow x_{\text{راس}} = \frac{-k}{2(-1)} = 3 \quad k = 6$$

$$\max(y) = -(3)^2 + 6(3) + \lambda = 17$$

۱۳۰. گزینه ۱ درست است.

مرکز دایره وسط قطر است بنابراین  $O \left| \begin{matrix} 4 \\ 1 \end{matrix} \right.$ . شعاع دایره  $OA = OB = r$  است:

$r = \sqrt{13}$  فقط گزینه (۱) بر روی محیط دایره است. زیرا فاصله آن تا مرکز دایره برابر  $r$  می باشد.

۱۳۱. گزینه ۳ درست است.

$$3^5 < 5^{10} < 3^6 \rightarrow 5 < \log_3^{5^{10}} < 6 \rightarrow [\log_3^{5^{10}}] = 5$$

$$\left[ \frac{1}{5 - \sqrt{24}} \right] = \left[ \frac{1}{5 - \sqrt{24}} \times \frac{5 + \sqrt{24}}{5 + \sqrt{24}} \right] = [5 + \sqrt{24}] = 9$$

$$4 < \sqrt{24} < 5$$

↓ +5

$$9 < 5 + \sqrt{24} < 10 \Rightarrow [5 + \sqrt{24}] = 9$$

$$9 + 5 = 14 = \text{حاصل نهایی}$$

۱۳۲. گزینه ۲ درست است.

چون دامنه تابع  $\frac{1}{x}$  است پس  $a = -1$  می باشد. از طرفی محل برخورد با محور  $x$  ها در  $y = 0$  است:

$$0 = 1 - \log_b^{(-1)-1} \rightarrow \log_b^0 = 1 \rightarrow b = 5$$

$$\text{حال تابع } y = 1 - \log_5^{(3x-1)} \text{ را با } y = -2 \text{ قطع می‌دهیم:}$$

$$1 - \log_5^{(3x-1)} = -2 \rightarrow \log_5^{(3x-1)} = 3$$

$$3x - 1 = 5^3 \rightarrow 3x - 1 = 125 \rightarrow 3x = 126 \quad \boxed{x = 42}$$

۱۳۲. گزینه ۱ درست است.

$$\begin{cases} m=0 \rightarrow y=-1 \\ m=1 \rightarrow x=1 \end{cases} \Rightarrow O(1, -1) \text{ مرکز دایره}$$


فاصله نقطه O مرکز دایره تا خط  $3x + 4y - 9 = 0$  برابر شعاع دایره است:

$$r = \frac{|3(1) + 4(-1) - 9|}{\sqrt{9+16}} = \frac{10}{5} = 2$$

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$$

$$x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0 \text{ معادله دایره}$$

۱۳۴. گزینه ۳ درست است.



$$(1) : \text{مسیر } \frac{\binom{4}{2}}{\binom{9}{2}} \times \frac{\binom{2}{1}(\binom{5}{0}) + (\binom{0}{1})(\binom{5}{1})}{\binom{7}{2}} = \frac{6}{36} \times \frac{11}{21} = \frac{11}{126}$$

$$(2) : \text{مسیر } \frac{\binom{5}{2}}{\binom{9}{2}} \times \frac{\binom{2}{0}(\binom{3}{1}) + (\binom{0}{1})(\binom{3}{2})}{\binom{7}{2}} = \frac{10}{36} \times \frac{9}{21} = \frac{15}{126}$$

$$(3) : \text{مسیر } \frac{\binom{4}{1}(\binom{5}{1})}{\binom{9}{2}} \times \frac{\binom{2}{1}(\binom{4}{0}) + (\binom{0}{1})(\binom{4}{1})}{\binom{7}{2}} = \frac{20}{36} \times \frac{9}{21} = \frac{30}{126}$$

$$\frac{11}{126} + \frac{15}{126} + \frac{30}{126} = \frac{56}{126} = \frac{4}{9}$$

۱۳۵. گزینه ۴ درست است.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \times \frac{f(2+h) + f(2)}{5} = 12$$

$$f'(2) \times \frac{2f(2)}{5} = 12$$

$$f'(2) \times \frac{2 \times (-1)}{5} = 12$$

$$\boxed{f'(2) = -30}$$


$$(f'(x) + \frac{1}{f(x)})' = f''(x) \times f'(x) - \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$\xrightarrow{x=2} x = 2 \Rightarrow f'(2) \times f''(2) - \frac{f''(2)}{f'(2)} = 3(-1)^2 \times (-30) - \frac{-3}{(-1)^2} = -60$$

۱۳۶. گزینه ۳ درست است.

در این نقطه:  $f'_+ = +\infty, f'_- = -\infty$  و نمودار پیوسته  $f$  به شکل ظاهر می‌شود که  $\min$  نسبی است.

در این نقطه:  $f'_+ = +\infty$  و نمودار به صورت ظاهر می‌شود و فاقد اکسترموم است.



در مجموع تابع ۵ اکسترموم نسبی دارد.

۱۳۷. گزینه ۱ درست است.

فرض کنید فضای نمونه ای  $X$  عضو دارد:

$$P(A) = \frac{3}{X}, P(B) = \frac{4}{X}, P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{12}{X^2}, P(A \cup B) = \frac{5}{X}$$

مستقل اند

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\left(\frac{5}{X} = \frac{3}{X} + \frac{4}{X} - \frac{12}{X^2}\right) \times X^2$$

$$5X = 3X + 4X - 12 \rightarrow X = 6$$

تعداد اعضای فضای نمونه ای

$$P(A' \cap B') = P(A \cup B)' = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{5}{X} = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

احتمال آنکه نه  $A$  و نه  $B$  همزمان اتفاق بیفتد.

۱۳۸. گزینه ۳ درست است.

$$(f^{-1} \circ g^{-1})(k) = 5 \rightarrow (g \circ f)^{-1}(k) = 5 \rightarrow (g \circ f)(5) = k$$

$$g(f(5)) = k \quad g(\gamma) = k \quad \lambda = k$$

۱۳۹. گزینه ۴ درست است.

$$2 = \text{انحراف معیار قدیم} \rightarrow 4 = \text{واریانس قدیم}$$

$$\bar{X} = 6$$

اگر تغییرات در داده‌ها را اعمال کنیم هر داده به صورت  $(x_i + 10) / 2$  یعنی  $2x_i + 10$  ظاهر می‌شود. با این کار میانگین قدیم هم در ۲ ضرب و با ۱۰ جمع می‌شود. اما انحراف معیار فقط ۲ برابر می‌شود:

$$CV = \frac{\text{انحراف معیار جدید}}{\text{میانگین جدید}} = \frac{2(2)}{2(6) + 10} = \frac{4}{22} = \frac{2}{11}$$

۱۴۰. گزینه ۳ درست است.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( 3x + \sqrt{\left( 3x - \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{1}{9}} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( 3x + \left| 3x - \frac{1}{3} \right| \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( 3x - 3x + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3}$$

۱۴۱. گزینه ۲ درست است.

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} [-\sin x] = [-(\circ^-)] = [\circ^+] = \circ$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} [-\sin x] = [-(\circ^+)] = [\circ^-] = -\circ$$

$f(\circ) = \circ$  (رد گزینه ۱) مقدار تابع

چون  $\lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = f(\pi)$  پس تابع در  $x = \pi$  پیوستگی راست دارد.

۱۴۲. گزینه ۱ درست است.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \lambda} \frac{x^3 - 8x^2 + 2x - 16}{6\sqrt[3]{x} - 12} &= \frac{\circ}{\circ} = \lim_{x \rightarrow \lambda} \frac{x^2(x - \lambda) + 2(x - \lambda)}{6(\sqrt[3]{x} - 2)} \times \frac{\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4}{\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow \lambda} \frac{(x - \lambda)(x^2 + 2)(\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4)}{6(x - \lambda)} = \frac{66 \times 12}{6} = 132 \end{aligned}$$

۱۴۳. گزینه ۴ درست است.


در فعالیت ۴ صفحه ۱۳۸ کتاب ریاضی (۱) این قاعده ترکیب (قاعده پاسکال) با مثال نمایش داده شده است و اثبات آن به صورت زیر است:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} &= \frac{(n-1)!}{(n-r)!(r-1)!} + \frac{(n-1)!}{(n-r-1)!r!} = \frac{(n-1)!r + (n-1)!(n-r)}{(n-r)!r!} \\ &= \frac{(n-1)![r+n-r]}{(n-r)!r!} = \frac{n(n-1)!}{(n-r)!r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = \binom{n}{r} \end{aligned}$$

بنابراین گزینه ۴ صحیح است.

راه دوم ( تستی ): با جایگذاری عددی برای  $n$  و  $r$  مثلًا  $n = 4$  و  $r = 2$  می‌توانید رد گزینه انجام دهید.

۱۴۴. گزینه ۳ درست است.



بررسی موارد:

(الف) درست است زیرا:

$$\begin{aligned} P(B - A) &= P(B) - P(A \cap B) = P(B) - P(A) \xrightarrow{P(B-A) \geq 0} P(B) - P(A) \geq 0 \\ \rightarrow P(A) &\leq P(B) \end{aligned}$$

ب) درست است زیرا  $A \subseteq B \rightarrow A - B = \emptyset$

$$P(A - B) = P(\emptyset) = \circ$$

ج) نادرست، زیرا در حالت  $A = B$  (یکی از زیر حالت‌های

$$P(B - A) = P(\emptyset) = \circ$$

د) درست: چون  $A \cap B = A \leftarrow A \subseteq B$  و داریم:

$$P(B - A) = P(B) - P(A \cap B) = P(B) - P(A)$$

$$A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A$$

ه) درست:

و) درست

$$A \subseteq B \rightarrow P(A) \leq P(B) \rightarrow 1 - P(A') \leq 1 - P(B') \rightarrow -P(A') \leq -P(B') \rightarrow P(A') \geq P(B')$$

۱۴۵. گزینه ۲ درست است.

حال اول: اگر گزینه سمت چپ حرف فارسی باشد:

$$32 \times 26 \times 31 = 25792$$

حال دوم: اگر گزینه سمت چپ حرف انگلیسی باشد:

$$26 \times 32 \times 25 = 20800$$

$$\text{تعداد حالات ممکن: } 25792 + 20800 = 46592$$

۱۴۶. گزینه ۴ درست است.

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

$$(\sqrt{x+2} - \sqrt{x-4})(\sqrt{x+2} + \sqrt{x-4}) = (\sqrt{x+2})^2 - (\sqrt{x-4})^2$$

$$(\sqrt{x+2} - \sqrt{x-4}) \times 3 = x + 2 - x + 4$$

$$(\sqrt{x+2} - \sqrt{x-4}) \times 3 = 6$$

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x-4} = 2$$

۱۴۷. گزینه ۳ درست است.

$$y = kx^2 - kx - 4$$

۱) دو شرط برای همواره زیر محور  $x$  ها بودن سهمی

$$2) \Delta < 0 \rightarrow (-k)^2 - 4(k)(-4) < 0$$

$$k^2 + 16k < 0$$

$$-16 < k < 0$$

اشتراک دو شرط (۱) و (۲) همان  $0 < k < -16$  است که شامل ۱۵ عدد صحیح است.

۱۴۸. گزینه ۱ درست است.

$$m = \tan(135^\circ) = -\tan 45^\circ = -1$$

ناحیه دوم مثلثاتی


$$2) \text{ محل برخورد با محور } y \text{ ها} \Rightarrow y = mx + h$$

$$2 = (-1)(0) + h \rightarrow h = 2$$

معادله خط

$$y = -x + 2 \quad \boxed{x = 2}$$

محل برخورد با محور  $x$  ها



راه حل تستی: چون مطابق شکل زیر مثلث ایجاد شده توسط خط با محور  $x$  و  $y$  ها قائم الزاویه متساوی الساقین است پس:

$$x = y = 2$$

۱۴۹. گزینه ۲ درست است.

$$\text{جمله } n \text{ ام دنباله هندسی به صورت } t_n = t_1 \cdot r^{n-1} \text{ می‌باشد}$$

:  $n = 5$  و  $r = 1/20$  و  $t_1 = 500,000$  با قرار دادن

$$t_5 = 500,000 \left(\frac{1}{20}\right)^4 = 1,036,800$$

$$= 10,368,000 - 5,000,000 = 5,368,000$$

۱۵۰. گزینه ۴ درست است.

جمله عمومی الگوی خطی به صورت  $C_n = an + b$  می‌باشد:

$$\begin{cases} ۲۵ = ۶a + b \\ ۴۱ = ۱۰a + b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = ۴ \\ b = ۱ \end{cases} \rightarrow C_n = ۴n + ۱ \xrightarrow{n=۳۰۰} C_{۳۰۰} = ۴(۳۰۰) + ۱$$

$$C_{۳۰۰} = ۱۲۰۱$$

۱۵۱. گزینه ۱ درست است.

فقط مورد «و» درست است.

۱۵۲. گزینه ۳ درست است.

ماکریم تابع  $|a| + c$  و مینیمم تابع  $-|a| + c$  می‌باشد و داریم:

$$a < 0 \Rightarrow \begin{cases} -a + c = 6 \\ a + c = -10 \end{cases} \Rightarrow c = -2, a = -8$$

$$b > 0 \Rightarrow \frac{2\pi}{b} = 6\pi \rightarrow b = \frac{1}{3}$$

بنابراین تابع به صورت  $f(x) = -8\sin(\frac{x}{3}) - 2$  ظاهر می‌شود و می‌باشد.

۱۵۲. گزینه ۴ درست است.

$$\sin x - \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

دو طرف به توان ۲

$$\underbrace{\sin^2 x + \cos^2 x}_{1} - 2\sin x \cdot \cos x = \frac{3}{4}$$

$$1 - \sin 2x = \frac{3}{4} \quad \sin 2x = \frac{1}{4}$$

$$\cos 4x = 1 - 2\sin^2(2x) = 1 - 2\left(\frac{1}{4}\right)^2 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

۱۵۳. گزینه ۳ درست است.

با جاگذاری ۱  $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$  خواهیم داشت:

$$(2\cos^2 x - 1) - \cos x + 1 = 0$$

$$2\cos^2 x - \cos x = 0 \rightarrow \cos x(2\cos x - 1) = 0$$

$$\cos x = 0 \rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\cos x = \frac{1}{2} \rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$$

جواب‌های بین  $0^\circ$  و  $2\pi$  عبارتند از:

$$x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{3}, x = \frac{5\pi}{3}$$

۱۵۵. گزینه ۲ درست است.

اگر  $(2,3)$  بر وارون تابع واقع باشد آن‌گاه  $(2,3)$  بر روی تابع اصلی واقع است در نتیجه:

$$2^3 - 2 + k = 3 \rightarrow k = -3$$

$$\text{بنابراین: } f(x) = x^3 - x - 3$$

$$f(-1) + f(0) = (-3) + (-3) = -6$$

### زیست‌شناسی

۱۵۶. گزینه ۱ درست است.

گزینه درست: مشاهده، اساس علوم تجربی است. در زیست‌شناسی فقط ساختارها و یا فرایندهایی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده‌اند بررسی می‌شوند.

سایر گزینه‌ها: سامانه پیچیده و مرکب را در ارتباط جاندار با محیط زیست بررسی می‌کنند. یعنی به عوامل زنده و غیرزنده‌ای که بر موجود اثر می‌گذارد، توجه می‌کنند. (صفحات ۳ تا ۷ سال دهم)

۱۵۷. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: همه گیرنده‌های حسی بافت پوششی مژکدار نیستند، گیرنده‌های بینایی و بویایی نورون هستند.

سایر گزینه‌ها: همه گیرنده‌های حسی اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند. در تنفس هوایی ATP به روش اکسایشی تولید می‌کنند و در غشاء یاخته پمپ سدیم - پتاسیم دارند. (صفحات ۲۰، ۲۱ و ۳۰ یازدهم)

۱۵۸. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: مواد انتیاگر بر سامانه کناره‌ای اثر گذاشته و موجب آزاد شدن ناقل‌های عصبی از جمله دوپامین می‌شوند.

سایر گزینه‌ها: مواد انتیاگر ممکن است تغییرات برگشت‌ناپذیر بر جا بگذارند. الکل سرعت تشکیل رادیکال‌های آزاد از اکسیژن را افزایش می‌دهد. با تأثیر بر بخش‌هایی از قشر مخ (نه هیپوکامپ) خودکنترلی فرد را کاهش می‌دهد. (الکل فعالیت مغز را کاهش می‌دهد) (صفحات ۱۲ یازدهم و ۷۵ دوازدهم)

۱۵۹. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: داشتن صفات مطلوب در نرها، (مانند دم بلند در طاووس) ممکن است جانور را در مقابل شکارچی آسیب‌پذیر کند.

سایر گزینه‌ها: در بیشتر پستانداران جانور ماده به‌علت هزینه‌ای که می‌گذارد سهم بیشتری در انتخاب جفت دارد. داشتن بیشترین تعداد زاده‌های سالم، معیاری برای موفقیت زادآوری است. (صفحات ۱۱۵ تا ۱۱۹ سال دوازدهم)

۱۶۰. گزینه ۴ درست است.

گزینه درست: هنگام دیدن اشیای دور، ماهیچه‌های جسم مژگانی به حالت استراحت درآمد و عدسی باریک‌تر می‌شود.

سایر گزینه‌ها: برای دیدن اشیای نزدیک قطر عدسی افزایش می‌یابد. تارهای آویزی منقبض نمی‌شوند. (صفحة ۲۵ سال یازدهم)

۱۶۱. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: مویرگ‌های غدد درون ریز، از نوع منفذدار بوده که در غشاء یاخته‌های پوششی منافذ زیاد همراه با غشاء پایهٔ ضخیم وجود دارد.

سایر گزینه‌ها: مویرگ‌های غمز استخوان از نوع ناپیوسته، کلیه‌ها منفذدار و غمز و نخاع از نوع پیوسته است. (صفحه ۶۶ و ۸۴ سال دهم)

۱۶۲. گزینه ۱ درست است.

گزینه درست: در نشخوارکنندگان، عمل گوارش میکروبی، قبل از گوارش آنزیمی صورت می‌گیرد.

سایر گزینه‌ها: در انسان، غددی که در لایه زیر مخاط و مخاط قرار دارند، ترشحات خود را توسط مجاری که به فروافتگی‌های لایه مخاطی راه دارند، ترشح می‌کنند. در کرم خاکی لوله گوارشی و جریان یک‌طرفه غذا وجود دارد. کرم کدو لوله گوارشی ندارد. در ملخ، آنزیم‌های معده و کیسه‌های معده به پیش معده وارد می‌شوند. (صفحات ۲۱ تا ۲۸ سال دهم)

۱۶۲. گزینه ۴ درست است.

گزینه درست: ۹۰ درصد گیاهات دانه‌دار با قارچ‌ها هم‌زیستی دارند. این قارچ‌ها مواد معدنی به خصوص فسفات برای گیاه فراهم می‌کنند.

سایر گزینه‌ها: هم‌زیستی ریشه عدس، ساقه گونرا و گیاه آبزی آزو لا برای دریافت نیتروژن ثبیت شده از باکتری‌هاست.  
(صفحات ۱۱۴ و ۱۱۵ سال دهم)

۱۶۳. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: توده داخلی بلاستوسیست به جنین و تروفولاست آن به کوریون تمایز می‌یابند. همه ژن‌ها در همه یاخته‌ها بیان نمی‌شوند.

سایر گزینه‌ها: با استفاده از این روش‌ها، می‌توان اینترفرون پایدارتر تولید کرد، مدت زمان فعالیت پلاسمین را افزایش داده و از تمایز یاخته‌های بنیادی کبد، مجاری صفوایی تولید کرد. (صفحات ۹۷ تا ۱۰۰ سال دوازدهم)

۱۶۴. گزینه ۴ درست است.

گزینه درست: پتانسیل عمل دارای دو مرحله است که در هر دو مرحله کانال‌های نشتی بدون دریچه سدیم و پتانسیم همواره باز هستند. در مرحله اول کانال دریچه‌دار سدیم و در مرحله دوم کانال دریچه‌دار پتانسیم باز است.

سایر گزینه‌ها: زمانی که اختلاف پتانسیل دو سوی غشا به  $+30$  (آستانه تحریک) برسد، پیام عصبی تولید می‌شود. پس از خروج  $K^+$  از یاخته، فعالیت پمپ سدیم - پتانسیم افزایش می‌یابد. (صفحات ۴ تا ۸ سال یازدهم)

۱۶۵. گزینه ۴ درست است.

گزینه درست: ترشحات یاخته‌های سرتولی که در دیواره لوله‌های زامه‌ساز قرار دارند، تمایز زامه‌ها را هدایت می‌کنند.  
سایر گزینه‌ها: مجازی زامه بر، مایع غنی از فروکتوز از غده وزیکول سمینال دریافت می‌کنند و پس از دریافت مایع شیری رنگ از غده پروستات، مایع قلیایی روان‌کننده از غدد پیازی میزراهی دریافت می‌کنند. (صفحات ۹۹ و ۱۰۰ سال یازدهم)

۱۶۶. گزینه ۱ درست است.

گزینه درست: گیرنده‌های چشایی یاخته‌های پوششی مژکدار تمایزیافته و گیرنده‌های بویایی نوروون‌های تمایزیافته‌ای هستند.  
هر دو نوع یاخته هسته و راکیزه دارند. (دنا خطی و حلقوی)

سایر گزینه‌ها: نوروون‌ها ناقل عصبی تولید می‌کنند و گیرنده‌های پوششی مژکدار توسط یاخته‌های نگهبان احاطه شده‌اند.  
(صفحات ۲۲، ۲۲ سال یازدهم)

۱۶۷. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: یاخته‌های دارینه‌ای و ماکروفازها که از تغییر شکل مونوویت در خارج از خون تشکیل یافته‌اند، همانند ماستوویت‌ها، بیگانه‌خوارهای خارج از خون هستند.

سایر گزینه‌ها: نوتروفیل‌ها مواد دفاعی زیادی حمل نمی‌کنند. لنفوویت‌های B، از یاخته‌های لنفوئیدی تولید می‌شوند.  
ماکروفازها و یاخته‌های دارینه‌ای بیگانه‌خواری می‌کنند. (صفحات ۶۷ تا ۶۹ سال یازدهم و ۷۲ سال دهم)

۱۶۸. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: عبور بیشتر آمینواسیدها از غشای یاخته پوششی پرز، همانند گلوکز از طریق انتشار تسهیل شده انجام می‌شود.

سایر گزینه‌ها: انتقال و جذب کیلومیکرون‌ها و ویتامین  $B_{12}$ ، با صرف انرژی صورت می‌گیرد. ماهیچه‌های حلق از نوع ماهیچه‌های مخطط هستند، پایان بلع و به استراحت در آمدن ماهیچه دیواره حلق، مستلزم آن است که یون کلسیم به سرعت و انتقال فعال به شبکه آندوپلاسمی برگردد. (صفحات ۲۴ تا ۳۲ سال دهم و ۴۹ سال یازدهم)

۱۶۹. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: هورمون‌های تیروئیدی  $T_3$  و  $T_4$  در همه یاخته‌های بدن گیرنده دارند و میزان انرژی در دسترس بدن را از طریق سوخت و ساز تأمین می‌کنند.

سایر گزینه‌ها: کلسی تونین مانع برداشت کلسیم از استخوان‌ها می‌شود. هورمون‌های اپی نفرین و نوراپی نفرین، بدن را برای پاسخ‌های کوتاه‌مدت آماده می‌کنند. گلوکاگون سبب تحریک گلیکوژن در یاخته کبد می‌شود. (صفحات ۵۸ تا ۶۰ سال یازدهم)

۱۷۱. گزینه ۱ درست است.

گزینه درست: هر کدام از یاخته‌های حبابک توسط غشای پایه که شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکو پروتئینی است، به یکدیگر متصل شده‌اند.

سایر گزینه‌ها: همه یاخته‌ها سورفاکtant ترشح نمی‌کنند. در بعضی مناطق غشای پایه مشترک است. ماکروفازها از یاخته‌های حبابک نیستند.

۱۷۲. گزینه ۴ درست است.

گزینه درست: هورمون‌های تیروئیدی در یاخته‌های کلیه گیرنده درون هسته‌ای دارند. بنابراین ژن‌های گیرنده این هورمون در این یاخته‌ها بیان می‌شوند. ژن سازنده هورمون انسولین در پانکراس بیان می‌شود.

سایر گزینه‌ها: هورمون‌های اربتروپویتین و رنین توسط کلیه تولید می‌شوند و هورمون ضد ادراری در یاخته‌های نفرونی گیرنده دارد. (صفحات ۷۳ و ۸۷ سال دهم و ۵۸ سال یازدهم)

۱۷۲. گزینه ۱ درست است.

گزینه درست: در محل مفصل‌ها، سر استخوان‌ها توسط بافت غضروفی پوشیده شده است.

سایر گزینه‌ها: محل قرارگیری هر نوع بافت در استخوان‌ها، متفاوت است. مفصل بین استخوان بازو با زند زبرین، از نوع لولای است. کپسول مفصلي، از انواع بافت پيوندي رشته‌اي است. (صفحات ۳۹، ۴۰ و ۴۳ سال یازدهم)

۱۷۴. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: رشته‌های اكتين و میوزین در سارکومر در کنار هم می‌لغزند، منقبض نمی‌شوند.

سایر گزینه‌ها: رشته‌های اكتين به خط‌های Z متصل‌اند. خط Z وسط دو بخش روشن دو سارکومر قرار دارد. (صفحات ۴۷ تا ۴۹ سال یازدهم)


۱۷۵. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: هر رشته از روی یکی از رشته‌های دنا همانندسازی می‌شود. بنابراین رشته‌های جدید ساخته شده، مکمل یکدیگرند. دنابسپاراز نوکلئوتیدهای مکمل را روپروی هم قرار می‌دهد.

سایر گزینه‌ها: در یاخته‌های پروکاربیوتی فقط یک جایگاه همانندسازی روی دنا وجود دارد. پيوندهایی را که دنا بسپاراز می‌شکنند، در مقابل هر باز آلی جدا شده مکمل آن را قرار می‌دهد و مولکول جدیدی را می‌سازد. (صفحات ۱۱، ۱۲ و ۱۳ سال دوازدهم)

۱۷۶. گزینه ۱ درست است.

گزینه درست: هر باکتری در هر ۲۰ دقیقه تقسیم می‌شود، در ۶۰ دقیقه ۳ بار تقسیم می‌شود ( $3^{20}$ )، ۸ مولکول DNA در لوله آزمایش دو نوار ایجاد می‌کنند که نوار بالایی دارای دو مولکول DNA با چگالی متوسط است.



۱۷۷. گزینه ۴ درست است.

گزینه درست: توالی سه نوکلئوتیدی در برگ میانی و هر رنای ناقل، پادرمزه نام دارد و مخصوص یک نوع آمینو اسید است.

سایر گزینه‌ها: رمزه‌های پایانی، پادرمزه ندارند. همه ژن‌ها بخش میانه ندارند. آمینواسیدها می‌توانند بیش از یک نوع رمزه روی یک RNA بالغ داشته باشند. (صفحات ۲۵ تا ۳۰ سال دوازدهم)

۱۷۸. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: آنزیم پرش‌دهنده، سیستم دفاعی یک باکتری بوده و ژن دنابسپاراز برای همانندسازی دنا و تکثیر باکتری‌ها ضروری است. بنابراین روی کروموزوم اصلی قرار دارد.

سایر گزینه‌ها: ژن مقاومت روی مولکول کمکی (دیسک) قرار دارد. ممکن است دیسک ژن مقاومت به پادزیست نداشته باشد. دوراهی همانندسازی‌ها، دو برابر جایگاه همانندسازی است. (صفحات ۹۳ تا ۹۷ سال دوازدهم)

۱۷۹. گزینه ۴ درست است.

گزینه درست: منطقه سرلادی موجود در ریشه، پایین‌تر از منطقه تمایز یافته‌ای که در آن منطقه تارهای کشنده و آوندها در حال تمایز و تشکیل‌اند قرار دارد.

سایر گزینه‌ها: سرلاد نخستین منشأ سه گروه بافت اصلی است. از یاخته‌های تمایز نیافته‌ای که هسته درشت به هم فشرده تشکیل یافته و توسط یاخته‌های کلاهک حفاظت می‌شود. (صفحه ۱۰۳ سال دهم)

۱۸۰. گزینه ۱ درست است.

گزینه درست: در حشرات دریچه‌های منفذار هنگام ورود خون به قلب باز و هنگام خروج خون از قلب بسته‌اند.

سایر گزینه‌ها: همولنف در همه بندپایان و بیشتر نرم‌تنان، نقش خون را بر عهده دارد. در هیدر حفره گوارشی انسعاب ندارد. در کرم خاکی، کمان‌های رگی، خون را به سمت پایین و سپس به عقب بدن می‌رانند. (صفحات ۷۶ و ۷۷ سال دهم)

۱۸۱. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: تارهای کشنده با جذب آب و املاح و هدایت آن به سمت درون پوست و آوندهای چوبی در ایجاد فشار ریشه‌ای و حفظ پیوستگی شیره خام نقش دارند.

سایر گزینه‌ها: تارهای کشنده بالاتر از منطقه تقسیم و در روپوست ریشه قرار دارند. از کلاهک فاصله دارند. تارهای کشنده و ریشه‌های جوان فاقد پوستک (کوتیکول) هستند. (صفحات ۱۰۰ و ۱۰۳ سال دهم)

۱۸۲. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: سرخرگ کلیه خون اکسیژن‌دار، دارای مواد غذایی و مواد دفعی را به کلیه وارد و سیاهرگ کلیه خون تیره دارای دی اکسید کربن و پالایش شده را از کلیه خارج می‌کند.

سایر گزینه‌ها: بین مویرگ اول و دوم اطراف نفرون یک سرخرگ کوچک وجود دارد. هماتوکریت به درون مویرگ وارد نمی‌شود. ادرار از طریق مجاری میزنای از کلیه‌ها خارج می‌شود. (صفحات ۹۱ تا ۹۵ سال دهم)

۱۸۲. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: در تقسیم رشتمان و کاستمن، بلافصله پس از تجزیه پوشش هسته و شبکه آندوپلاسمی در پرومتفاز فامتن‌های دو فامینکی (در میوز و میتوز) از محل سانتروم به رشته‌های دوک متصل می‌شوند.

سایر گزینه‌ها: فام تن‌ها با حداقل فشردگی در متفاصلها در استوای یاخته ردیف می‌شوند. در تقسیم رشتمان تتراد تشکیل نمی‌شود. (صفحات ۸۵ تا ۹۲ سال یازدهم)

۱۸۴. گزینه ۴ درست است.

گزینه درست: یکی دیگر از عواملی که در پایان دم مؤثر است، پیامی است که از ماهیچه‌های نایزه‌ها به بصل النخاع ارسال می‌شود.

سایر گزینه‌ها: انقباض ماهیچه‌های شکمی به کاهش حجم قفسه سینه کمک می‌کند. هموگلوبین با اتصال به یون هیدروژن مانع اسیدی شدن خون می‌شود. مرکز تنفس در پل مغزی می‌تواند مدت زمان دم و لحظه توقف آن را تعیین کند. (صفحات ۴۵ تا ۵۱ سال دهم)

۱۸۵. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: در بخش نخاع پرده داخلی مننژ، مجاور بخش سفید میلین دار قرار دارد.

سایر گزینه‌ها: در مسیر انکاس دست، ماهیچه سه سر در حالت استراحت قرار دارد. برجستگی‌های چهارگانه، بخشی از ساقه مغز هستند. لوب‌های بویایی در کنار هیپوکامپ قرار دارند. (اولین جفت عصب مغز اعصاب بویایی هستند) (صفحات ۹ تا ۱۷ سال یازدهم)

#### ۱۸۶. گزینه ۱ درست است.

گزینه درست: پادتن‌ها توسط لنفوسيت‌های B تولید می‌شوند که می‌توانند سبب فعال شدن پروتئين‌های مکمل شوند. سایر گزینه‌ها: هر سه مورد ترشح اينترفرون و تولید ماده ضد انعقاد خود و فعالیت ياخته‌های دارينه‌اي مربوط به دومين خط دفاعي است. (صفحات ۶۷ تا ۷۳ سال یازدهم)

#### ۱۸۷. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: گره اول و دوم بافت گرهی توسط رشتهدایی از جنس ماهیچه قلب به يكديگر متصل‌اند. سایر گزینه‌ها: جنس دريچه‌های قلب و لایه عايق بين دھليزها و بطن، بافت پيوندی فاقد ماهیچه است. هر دو لایه پريکارد و ابي‌كارد بافت پوششی سنگفرشي دارند. (صفحات ۵۷ تا ۶۱ سال دهم)

#### ۱۸۸. گزینه ۴ درست است.

گزینه درست: برای عبور گلوكز از ياخته‌های پوششی روده، پروتئين هم انتقالی با سديم، پمپ سديم - پتانسيم و مولکول انتقال دهنده به روش تسهيل شده، همکاري دارند.

ساير گزينهها: ليپيدها به شكل كيلوميكرون، برون راني می‌شوند. ماهيچه ديواره حلق از نوع مخطط است و به صورت انکاسي توسط اعصاب پيکري حرکت می‌کند. ويتامين K محلول در چربی است و از طریق لنف به قلب حمل می‌شود. (صفحات ۱۶ تا ۳۲ سال دهم)

#### ۱۸۹. گزینه ۱ درست است.

گزینه درست: آندودرم، انتقال مواد به ياخته‌های آوند چوبی را بر عهده دارد. سایر گزینه‌ها: در روپوست برگ فقط ياخته‌های نگهبان روزنه کلروپلاست دارند. همه ياخته‌ها (چه مرده، چه زنده) دارای لان و لایه نخستین هستند. (صفحات ۱۰۰ و ۱۲۰ سال دهم)

#### ۱۹۰. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: قبل از ناپديد شدن دوك، لايه‌اي به نام تيغه ميانی، سيتوبلاسم را به دو قسمت تقسيم می‌کند و پروتوبلاست هر يك از ياخته‌های تازه تشکيل شده، لايه يا لايه‌های ديگري به نام ديواره نخستين می‌سازند.

ساير گزينهها: ديواره در همه ياخته‌های گياهي چوبی نمي‌شود. در کاناال‌های پلاسموسومی ديواره تشکيل نمي‌شود. در ساختار تيغه ميانی و ديواره نخستين کوتين وجود ندارد. (صفحات ۹۲ و ۹۳ سال دهم و ۸۶ سال یازدهم)

#### ۱۹۱. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: هورمون FSH سبب بزرگ و بالغ شدن انبانک و افزایش ناگهانی LH در اواسط دوره جنسی موجب تخمک‌گذاری می‌شود.

ساير گزينهها: پروژسترون در نيمه دوم جنسی از جسم زرد ترشح می‌شود. جسم زرد تحت تأثير LH فعالیت ترشحی خود را افزایش می‌دهد. باز خورد منفی بین اين هورمون‌ها مانع رشد انبانک جدید می‌شود. (صفحات ۱۰۳ تا ۱۰۷ سال یازدهم)

#### ۱۹۲. گزینه ۱ درست است.

گزینه درست: مورو لا بعد از تبدیل شدن به بلاستوسیست تبدیل می‌شود. ياخته‌های درون بلاستوسیست می‌تواند منشاً تشکیل يک يا دو جنین شود.

ساير گزينهها: برون شامه (كوريون) از تروفوبلاست که لايه خارجي بلاستوسیست است تشکيل می‌شود. در مرحله مورو لا تعداد ياخته بسیار کم و اندازه ياخته‌ها بزرگتر هستند. برون شامه هورمون HCG تولید می‌کند. (صفحات ۱۰۹ تا ۱۱۲ سال یازدهم)

۱۹۲. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: محصول کاستمن یک یاخته  $2n = 20$ ، یاختهای با عدد کروموزومی  $10 = 2n = 20$  است. بنابراین درون هر یاخته در مرحله تلوفاز ۱ و ۲ دو مجموعه کروموزوم (فام تن) وجود دارد. (هر مجموعه فام تن  $n=5$  است) سایر گزینه‌ها: در همه یاخته‌های حاصل از میوز یاخته  $4n$ ، کروموزوم همتا وجود دارد. از میوز این یاخته، هسته‌های هاپلولئید تولید نمی‌شود. در متافاز ۱ این یاخته ۱۰ تتراد تشکیل می‌شود. (صفحه ۶۱ سال دوازدهم)

۱۹۳. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: در هموگلوبین و میوگلوبین برای تشکیل ساختار دوم، پیوند هیدروژنی بین بخش‌های یک پلی پپتید تشکیل می‌شود. سایر گزینه‌ها: تغییر در جایگاه فعال آنزیم می‌تواند سبب تغییر در فعالیت آن شود. ساختار دوم پروتئین، در هر پلی پپتید ایجاد می‌شود. اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد میوگلوبین بود که اکسیژن در تار ماہیچه‌ای ذخیره می‌کند. (صفحات ۱۶، ۱۷ و ۲۰ سال دوازدهم)

۱۹۴. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: RNA ریبوزومی با نقش آنزیمی خود، آمینواسیدها را درون زمینه سیتوپلاسم به یکدیگر متصل می‌کند. سایر گزینه‌ها: شکستن پیوندهای فسفودی استر برای تشکیل RNA بالغ و تشکیل RNA و DNA توسط بسپارازها و برقراری پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئیدها به هنگام رونویسی، درون هسته انجام می‌شود. (صفحات ۲۲ تا ۲۷ سال دوازدهم)

۱۹۵. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: در مراحل ترجمه یک mRNA، پیوندهای پپتیدی فقط در جایگاه A ریبوزوم تشکیل و در جایگاه P ریبوزوم شکسته می‌شوند.


سایر گزینه‌ها: در مرحله پایانی پیوندهای هیدروژنی در جایگاه P شکسته می‌شوند. پیوند اشتراکی در مرحله پایانی سبب جدا شدن رشته پلی پپتیدی از RNA ناقل می‌شود. (صفحات ۳۰ و ۳۱ سال دوازدهم)

۱۹۶. گزینه ۴ درست است.

گزینه درست: جهش در رامانداز یا توالی افزاینده، بر مقدار رونویسی از ژن تأثیر می‌گذارد. سایر گزینه‌ها: تشکیل دوپارتیمین عملکرد دنابسپاراز را مختل می‌کند. جهش‌های حذف و اضافه الزاماً به تغییر چارچوب خواندن نمی‌انجامد. جهش واژگونی سبب تغییر طول فام تن نمی‌شود. (صفحات ۴۹ تا ۵۲ سال دوازدهم)

۱۹۷. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: با توجه به نمودار شکل ۹ صفحه ۴۵ سال دوازدهم، مشاهده می‌شود که صفتی دارای سه جایگاه ژنی که هر کدام دو گرده دارند، در میانه نمودار توزیع ژنتیپ‌هایی قرار دارند که هر کدام سه الی غالب دارند. در صفتی که پنج جایگاه ژنی با همان مشخصات دارد، در میانه نمودار ژنتیپ‌هایی قرار می‌گیرند که هر کدام پنج الی غالب دارند.



۱۹۸. گزینه ۱ درست است.

گزینه درست: در گونه‌زایی هم‌میهنه مشاهده کردیم که خطای میوزی و خود لقاچی گیاهان گل مغربی  $4n$  منجر به تشکیل گونه‌جديد شد.

سایر گزینه‌ها: انتخاب طبیعی فراوانی فتوتیپ‌ها را تغییر داده و با انتخاب افراد سازگارتر، تفاوت‌های فردی و در نتیجه گوناگونی را کاهش می‌دهد. بنابراین شباهت افراد را افزایش می‌دهد. آمیزشی که به رخ نمود یا ژن نمود بستگی داشته باشد، دیگر تصادفی نیست. شرایط نامناسب محیط یا تغییر در شرایط محیط، می‌تواند سبب مطلوب شدن یک دگره نامطلوب شود. (صفحات ۵۵ تا ۶۱ سال دوازدهم)

۲۰۰. گزینه ۳ درست است.

گزینه درست: اکسین‌ها، با افزایش رشد طولی سلول سبب افزایش طول ساقه می‌شوند. سیتوکینین‌ها محرك تشکیم یاخته‌اند. سایر گزینه‌ها: جیبرلین‌ها محرك رویش دانه‌اند. افزایش نسبت اتیلن نسبت به اکسین سبب تشکیل لایه جداگرای برگ می‌شود. اکسین جوانه رأسی، تولید اتیلن در جوانه‌های جانی را افزایش سبب چیرگی رأسی می‌شود. (صفحات ۱۴۵ تا ۱۴۵ سال یازدهم)

۲۰۱. گزینه ۴ درست است.

گزینه درست: در یوکاریوت‌ها، یون‌های هیدروژن بر اساس شیب غلظت از تیلاکوئید خارج می‌شوند. پروکاریوت‌ها کلروپلاست ندارند.

سایر گزینه‌ها: یاخته‌های غلاف آوندی در گیاهان  $C_3$  سبزدیسه ندارند،  $CO_2$  را در مرحله در چرخه کالوین ثبیت می‌کنند. در تنفس نوری، مولکول دو کربنی پس از خروج از کلروپلاست، تجزیه شده و  $CO_2$  از آن خارج می‌شود. پروتئینی که بین فتوسیستم‌های ۱ و ۲ قرار دارد  $H^+$  را به درون تیلاکوئید پمپ می‌کند. (صفحات ۸۳ تا ۸۷ سال دوازدهم)

۲۰۲. گزینه ۱ درست است.

گزینه درست: در یاخته‌های حاصل از میوز ۱ و ۲ تعداد فام تن‌ها برابر و یاخته‌ها تک لاد (n) هستند. فرق فام تن‌ها در تعداد فامینه‌های آن‌هاست.

سایر گزینه‌ها: در زنان، با ورود سر زامه به نام یاخته ثانویه، میوز ۲ آغاز می‌شود. محصول میوز در زنان یک گامت است. فام تن‌ها در تلوفاز ۱ دو فامینه‌ای و در تلوفاز ۲ تک فامینه‌ای هستند. (صفحات ۹۲ و ۹۳ سال یازدهم)

۲۰۳. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: تخم ضمیمه از لقاح یاخته دوتایی و آنتروزوئید درون هر تخمک تشکیل می‌شود. درون همان تخمک یاخته تخم از تخمزا و آنتروزوئید تشکیل می‌شود. تخم ضمیمه یک مجموعه فام تن بیشتر از تخم اصلی دارد.

سایر گزینه‌ها: اگر ژنوتیپ یک گیاه  $2n=AaBb$  باشد، یاخته‌های از میوز ،  $Ab, AB$  و  $ab$  خواهد شد. درون هر برچه یک مادگی چند برچه‌ای تخمک وجود دارد. درون هر تخمک یکی از سلول‌های بافت خورش میوز انجام می‌دهد. یکی از یاخته‌های n کروموزومی تبدیل به کیسه روبانی می‌شود که می‌تواند یکی از چهار ژنوتیپ را داشته باشد. بنابراین در یک مادگی چند برچه‌ای بعد از لقاح می‌تواند یاخته‌هایی با ژنوتیپ‌های متفاوت تشکیل شود. (صفحات ۱۲۴ تا ۱۳۳ سال یازدهم)

۲۰۴. گزینه ۴ درست است.

گزینه درست: در روش هوازی، با دریافت انرژی از هر نوع ماده آلی FADH و NADH تولید می‌شود که در نهایت باید اکسیژن با دریافت الکترون از زنجیره انتقال الکترون اکسید شود.

سایر گزینه‌ها: الکترون برانگیخته از آنزیم ATP ساز عبور نمی‌کند. ATP به روش نوری در فتوسنتز تولید می‌شود. ممکن است ماده آلی گلوکز نباشد و مرحله گلیکولیز انجام نشود. (صفحات ۶۶ تا ۷۳ سال دوازدهم)

۲۰۵. گزینه ۲ درست است.

گزینه درست: هر سلولی که تازک دارد، می‌تواند فرایند گلیکولیز را در زمینه یاخته انجام دهد. سایر گزینه‌ها: برخی باکتری‌ها کلروفیل دارند ولی بی‌هوازی هستند و اکسیژن مصرف نمی‌کنند. پلاست رنگی و اندوخته‌ای فتوسنتز انجام نمی‌دهند. همه یاخته‌های زنده و فعل رپوپوت سبزدیسه ندارند و قند سه کربنی تولید نمی‌کنند. (فصل‌های ۵ و ۶ سال دوازدهم)

## فیزیک

۲۰۶. گزینه ۴ درست است.

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{m_A}{m_B} \times \frac{V_B}{V_A}$$

$$\frac{V_B}{V_A} = \left(\frac{r_B}{r_A}\right)^3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V = \frac{4}{3} \pi r^3 \text{ حجم کره} \\ \frac{m_A}{m_B} = 1 \end{array} \right.$$

اما:

$$\Rightarrow \frac{\rho_A}{\rho_B} = 1 \times \left(\frac{r_B}{r_A}\right)^3$$

$$\frac{\rho_A}{\rho_B} = \left(\frac{6}{3}\right)^3 = 8$$

۲۰۷. گزینه ۱ درست است.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow 0 / 4 = \frac{v_2 - v_1}{0} \rightarrow v_2 = 2 \frac{m}{s}$$

$$w_t = \Delta k \rightarrow w_t = \frac{1}{2} m (v_2 - v_1) \rightarrow w_t = \frac{1}{2} \times 800 \times 2^2$$

$$w_t = 1600 \text{ J}$$

۲۰۸. گزینه ۲ درست است.

$$E_1 = E_2 \rightarrow u_1 + k_1 = u_2 + k_2$$

$$\frac{u_2 = 4k_2}{\cancel{u_2 = 4k_2}} \rightarrow 0 + k_1 = 2k_2 + k_2 + k_2 \rightarrow k_1 = 3k_2$$

$$v_2 = \sqrt{300} \Rightarrow v_2 = 10 \sqrt{3} \frac{m}{s}$$

۲۰۹. گزینه ۳ درست است.

$$h = \frac{V}{A} = \frac{V}{\frac{\pi D^3}{4}} \rightarrow h = \frac{4 \times 1 / 0 \times 1^3}{3 \times (0 / 1)^2} = 0 / 2m$$

$$P = \rho gh = 1200 \times 10 \times 0 / 2 = 2400 \text{ Pa} = 2 / 4 \text{ kPa}$$

راه دوم

$$P = \frac{mg}{A} = \frac{\rho v g}{\frac{\pi D^3}{4}} \rightarrow \rho = \frac{4 \times 1200 \times 1 / 0 \times 1^3 \times 10}{3 \times (0 / 1)^2} = 2400 \text{ Pa} = 2 / 4 \text{ kPa}$$

۲۱۰. گزینه ۱ درست است.

$$P_1 = P_2 \rightarrow \frac{W_1}{A_1} = \frac{W_2}{A_2} \rightarrow \frac{W_2}{W_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{\pi r_2^3}{\pi r_1^3} \rightarrow W_2 = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^3 W_1$$

$$W_2 = (0)^3 \times 300 = 7500 \text{ N}$$

۲۱۱. گزینه ۲ درست است.

$$\theta_1 = 27^\circ C$$

$$T_1 = \theta_1 + 273 = 300 K$$

$$\frac{V_r}{V_i} = \frac{T_r}{T_i} = \frac{T_i + \Delta T}{T_i} \rightarrow \frac{V_r}{20} = \frac{300 + 20}{300} \rightarrow V_r = 22 \text{ cm}^3$$

$$\Delta V = 22 - 20 = 2 \text{ cm}^3$$

$$\Delta V = A \Delta h \rightarrow \Delta h = \frac{\Delta V}{A} = \frac{2}{\frac{2}{0.4}} = 0.4 \text{ cm}$$

۲۱۲. گزینه ۳ درست است.

$$A_1 = \pi(r_r^2 - r_i^2) = \pi(40^2 - 20^2) = 3(1600 - 400) = 3600 \text{ cm}^2$$

$$\Delta A = \alpha A_1 \Delta \theta = 2 \times 4 \times 10^{-3} \times 3600 \times (-50) = -144 \text{ cm}^2$$

$$A_r = A_1 + \Delta A = 3600 - 144 \rightarrow A_r = 3456 \text{ cm}^2$$


۲۱۳. گزینه ۴ درست است.

$$F_r + F_i = F$$

$$\frac{Kq_r q_f}{r_r^2} + \frac{Kq_r q_f}{r_i^2} = \frac{Kq_i q_f}{r_i^2}$$

$$\frac{2}{100} + \frac{q_r}{900} = \frac{2}{100} \rightarrow q_r = 1 \mu C$$

۲۱۴. گزینه ۱ درست است.



$$\Delta k = k_r - k_i = 10/10 j$$

$$\begin{cases} \Delta k = w_E \\ W_E = q |E| d \cos \theta \quad \theta = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 10/10 = (10/5 \times 10^{-3}) \times 10^3 \times d \times \cos(0)$$

$$\rightarrow d = \frac{10/10}{10/5} = 10/3 \text{ m} \quad d = 30 \text{ cm}$$

۲۱۵. گزینه ۴ درست است.

$$I = \frac{\epsilon_1 + \epsilon_r}{R_T + r_i + r_r}$$

$$I = \frac{20 - 1}{5 + 2 + 1} \rightarrow I = \frac{3}{4} A$$


$$P = RI^2 \rightarrow P = 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 \rightarrow P = \frac{9}{4} = 4.5 \text{ W}$$

۲۱۶. گزینه ۱ درست است.

$$R = \rho \frac{L}{A} \xrightarrow{L_1 = L_r} R_r = 2R_i = 10 \Omega$$

$$R_r = R'_r (1 + \alpha \Delta \theta) \rightarrow 10 = R'_r (1 + 4 \times 10^{-3} (120 - 20)) \rightarrow R'_r = 10/4 = 2.5 \Omega$$

۲۱۷. گزینه ۳ درست است.



$$B_i = \frac{\mu_0 I_i}{2 R_i} = \frac{10 \times 10^{-3}}{2} \times \frac{10/5}{10} = 3 \times 10^{-6} \pi$$

$$B_r = \frac{\mu_0 I_r}{2 R_r} = \frac{10 \times 10^{-3}}{2} \times \frac{10/5}{10} = 6 \times 10^{-6} \pi$$

$$B_T = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = 10^{-6} \sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5} \times 10^{-6} \pi$$

۲۱۸. گزینه ۲ درست است.

$$x = 3 \cos \pi t + 5t^2 + 7$$

$$t = 0$$

$$x = 3 \cos \pi(0) + 5(0)^2 - 7$$

$$x = 3 - 7 = -4 \xrightarrow[\text{حرکت در محور } x]{} \vec{d} = -4\vec{i}$$

۲۱۹. گزینه ۴ درست است.

$$\bar{\varepsilon} = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \rightarrow \bar{\varepsilon} = -NA \frac{\Delta B}{\Delta t}$$

$$|\bar{\varepsilon}| = 1000 \times 50 \times 10^{-4} \times 16 \rightarrow |\bar{\varepsilon}| = 800 \text{ V}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{800}{20} \rightarrow I = 4 \times 10^3 \text{ A} = 4 \text{ mA}$$

۲۲۰. گزینه ۲ درست است.

$$d = \frac{v' \times (\Delta t')}{2} = \frac{5}{2} v' t'$$

جا به جایی مساحت زیر نمودار است

$$v_{av} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{\frac{5}{2} v' t'}{\Delta t'} = \frac{1}{2} v'$$

جا به جایی را بر مدت زمان تقسیم کنیم

۲۲۱. گزینه ۱ درست است.


$$v = v_0 + at$$

شكل عمومی معادله

$$v = -6t + v_0 \rightarrow -4 = -6(2) + v_0$$

$$v_0 = \lambda \frac{m}{s} \rightarrow v = -6t + \lambda$$

۲۲۲. گزینه ۳ درست است.



$$\Delta v = 16 - 8 = 8s$$

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow 2 \frac{8}{t_1} \rightarrow t_1 = 4s$$

$$\Delta x = s_1 + s_2 = \frac{8 \times 2}{2} + \frac{16 \times (t_1 - 2)}{2} \xrightarrow{t_1 = 4}$$

$$\Delta x = 8 + 16 = 24m \quad v_{av} = \frac{24}{4} = 6 \frac{m}{s}$$

۲۲۲. گزینه ۲ درست است.

اگر مسافت طی شده در  $\frac{3t}{4}$  را  $L'$  بنامیم:

$$\frac{L'}{d} = \left(\frac{t'}{t}\right)^2 \rightarrow \frac{L'}{d} = \left(\frac{\frac{3t}{4}}{t}\right)^2 \rightarrow \frac{L'}{d} = \frac{9}{16} \rightarrow L' = \frac{9}{16} d$$

$$d = L + \frac{9}{16}d \rightarrow L = d - \frac{9}{16}d \rightarrow L = \frac{7}{16}d$$

۲۲۴. گزینه ۳ درست است.

$$a = a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{24 - 9}{5} = \frac{15}{5} = 3 \frac{m}{s^2}$$

$$\begin{cases} v = at + v_0 \\ v_0 = 0 \end{cases} \rightarrow v = 3t$$

شكل عمومی

۲۲۵. گزینه ۴ درست است.

$$\vec{F} = m\vec{a} \rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{-2 \circ \vec{i}}{5} = -0.4\vec{i}$$

$$v_0 = 4 \frac{m}{s}$$

$$\begin{cases} v = v_0 + at \rightarrow v = 4 - 0.4t \\ x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t \rightarrow x = -0.2t^2 + 4t \end{cases} \xrightarrow{t=5} \begin{array}{l} v = -1 \frac{m}{s} \\ x = -5m \end{array}$$

$$\begin{cases} \vec{d} = -5\vec{i} \\ \vec{v} = -1\vec{i} \end{cases}$$


۲۲۶. گزینه ۱ درست است.

$$W_{AE} = W_{BM} \rightarrow M_A g_E = M_B g_M$$

$$\frac{M_B}{M_A} = \frac{g_E}{g_M} = \frac{9/9}{1/65} = 6$$

$$\frac{W_{BE}}{W_{AM}} = \frac{M_B g_E}{M_A g_M} = \frac{M_B}{M_A} \times \frac{g_E}{g_M} \rightarrow \frac{W_{BE}}{W_{AM}} = 6 \times 6 = 36$$

۲۲۷. گزینه ۳ درست است.



$$\begin{cases} F_{هوا} = F_{برآیند} + mg \\ F_{هوا} = ma \end{cases} \Rightarrow F_{هوا} + mg = ma$$

$$F_{هوا} = M(a - g)$$

$$F_{هوا} = 10 \times (14 - 10) = 40 N$$

۲۲۸. گزینه ۱ درست است.

$$F_{برآیند} = 0 \rightarrow F_N - W = 0 \rightarrow F_N = mg = 60 N$$

$$F_{برآیند} = F - f_k = ma \rightarrow F - \mu_k N = ma$$

$$14 - \mu_k \times 60 = 6 \times 3$$

$$14 - 18 = 6 \circ \mu_k \rightarrow \mu_k = \frac{6}{60} = 0.1$$

۲۲۹. گزینه ۲ درست است.

$$اول ثابت فنر \rightarrow x = 25 - 22 = 3 cm = 0.03 m$$

$$k = \frac{F_e}{x} = \frac{18}{\% ۴} \xrightarrow{F_e = ۴N} F_e = kx' \rightarrow x' = \frac{۴}{\% ۴} = \% ۴m = ۴cm$$

طول فنر =  $22 + 4 = 26cm$

۲۳۰. گزینه ۴ درست است.

$$a = \frac{v - v_0}{\Delta t} \rightarrow \alpha = \frac{v - v_0}{t} \rightarrow v = ۱۲ \frac{m}{s}$$

$$m = \frac{\rho}{v} \rightarrow m = \frac{۴}{12} = ۰.۳3kg$$

۲۳۱. گزینه ۳ درست است.

$$w = ۲\pi f = ۲\pi \times ۱۰ = ۲\pi \frac{rad}{s}$$

شکل عمومی معادله

$$\begin{cases} A = ۵cm = \% ۵m \\ X = \% ۵ \cos(۲\pi t) \end{cases}$$

۲۳۲. گزینه ۴ درست است.

$$a_{max} = aw^2 \rightarrow \frac{1}{\alpha} = \% ۱ \times w^2$$

$$w^2 = \frac{۱۰۰}{\alpha} = ۲۵ \rightarrow w = ۵ \frac{rad}{s}$$

$$w = \sqrt{\frac{g}{L}} \rightarrow \alpha = \sqrt{\frac{۱۰}{L}} \rightarrow ۲۵ = \frac{۱۰}{L}$$

$$L = \frac{۱۰}{۲۵} = ۰.۴m = ۴0cm$$

۲۳۳. گزینه ۱ درست است.

$$\begin{cases} E = \alpha / \alpha j \\ A = \% \alpha m \end{cases}$$

$$E = \frac{1}{\alpha} KA^2$$

$$\alpha / \alpha = \frac{1}{\alpha} K(\% \alpha)^2$$

$$K = \frac{\alpha / \alpha}{\frac{1}{\alpha} \times (\% \alpha)^2} \rightarrow K = ۴ \alpha \times \frac{N}{M}$$

۲۳۴. گزینه ۲ درست است.

$$hf_B = \alpha hf_A \rightarrow f_B = \alpha f_A \xrightarrow{\lambda = \frac{V}{f}} \lambda_B = \frac{1}{\alpha} \lambda_A$$

$$\lambda_A - \lambda_B = \lambda \alpha \times ۱۰^{-۹} \rightarrow \lambda_A - \frac{1}{\alpha} \lambda_A = \lambda \alpha \times ۱۰^{-۹} \rightarrow \lambda_A = ۱۰^{-۶} m$$

$$f_A - f_B = f_A - \alpha f_A = -\alpha f_A \rightarrow f_A - f_B = -\alpha \frac{V}{\lambda_A} = -\alpha \frac{۳ \times ۱۰^۸}{۱۰^{-۶}}$$

$$f_A - f_B = -1/2 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

۲۳۵. گزینه ۴ درست است.

$$\frac{1}{\lambda} = R \left( \frac{1}{\nu} - \frac{1}{n^2} \right) = R \left( \frac{n^2 - 4}{4n^2} \right) \Rightarrow \frac{4n^2}{n^2 - 4} = \lambda R = 450 \times 10^{-2} = \frac{9}{2}$$

$$4n^2 = 9n^2 - 36 \rightarrow n^2 = 36 \rightarrow n = 6$$

### شیمی

۲۳۶. گزینه ۲ درست است.

زیرا، داریم:

$${}_{35}^{80}\text{Br}^- \left\{ \begin{array}{l} N = 80 - 35 = 45 \\ e = 35 + 1 = 36 \end{array} \right\} \Rightarrow 45 - 36 = 9$$

$${}_{24}^{52}\text{Cr}^{3+} \left\{ \begin{array}{l} N = 52 - 24 = 28 \\ e = 24 - 2 = 22 \end{array} \right\} \Rightarrow 28 - 22 = 6$$

$$\frac{9}{6} = 1/5$$

۲۳۷. گزینه ۱ درست است.

زیرا، داریم:

$$? \text{gCO} = 4/3 \times 10^{23} \text{ moleculeCO} \times \frac{1 \text{ molCO}}{6/0.2 \times 10^{23} \text{ moleculeCO}} \times \frac{28 \text{ gCO}}{1 \text{ molCO}} = 20 \text{ gCO}$$

$$? \text{gO}_2 = 0/4 \text{ molO}_2 \times \frac{32 \text{ gO}_2}{1 \text{ molO}_2} = 12/8 \text{ gO}_2$$


$$20 \text{ g} + 12/8 \text{ g} = 32/8 \text{ g}$$

۲۳۸. گزینه ۴ درست است.

زیرا، در دوره چهارم جدول دوره‌ای، فقط در عنصر کریپتون هر دو زیرلایه  $3d$  و  $4p$  کاملاً از الکترون پر شده‌اند و همچنین در این دوره، عنصر کلسیم از دسته  $S$ ، ۸ عنصر از دسته  $d$  (به غیر از کروم و مس) و ژرمانیم از دسته  $p$  در بیرونی‌ترین زیرلایه خود تنها دو الکترون دارند.

۲۳۹. گزینه ۴ درست است.

۲۴۰. گزینه ۳ درست است.



۲۴۱. گزینه ۲ درست است.

زیرا، داریم:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{0/4L}{(47+273)K} = \frac{V_2}{(55+273)K} \Rightarrow V_2 = 0/41L$$

$$\frac{0/41 - 0/4}{0/4} \times 100 = 2/5\%$$

۲۴۲. گزینه ۱ درست است.

زیرا، داریم:

$$\text{?molBr}^- = ۵۰ \text{ ton} \times \frac{۱۰۰۰ \text{ kg}}{۱\text{ton}} \times \frac{۶۵ \times ۱۰^{-۳} \text{ gBr}^-}{۱\text{kg}} \times \frac{۱\text{molBr}^-}{۸۰ \text{ gBr}^-} = ۴۰ / ۶ \text{ molBr}^-$$

۲۴۳. گزینه ۳ درست است.

زیرا، در آرایش الکترون - نقطه‌ای کاتیون آن، جفت الکترون ناپیوندی وجود ندارد.

۲۴۴. گزینه ۳ درست است.

زیرا، داریم:

$$\text{?mol} = ۱\text{L} \times \frac{۱۰۰۰ \text{ mL}}{۱\text{L}} \times \frac{۱/۴\text{g}}{۱\text{mL}} \times \frac{۶۸ \text{ gHNO}_۳}{۱۰۰ \text{ g}} \times \frac{۱\text{molHNO}_۳}{۶۳ \text{ gHNO}_۳} = ۱۵ / ۲۱ \text{ mol.L}^{-۱}$$

$$M_۱V_۱ = M_۷V_۷ \Rightarrow ۱۵ / ۲۱ \times ۲۵ = M_۷ \times ۵۰ \Rightarrow M_۷ = ۷ / ۶ \text{ mol.L}^{-۱}$$

۲۴۵. گزینه ۴ درست است.

زیرا، داریم:

$$\text{?gCO}_۷ = ۱۰^۶ \text{ tonFe} \times \frac{۲۰۰ \text{ gCO}_۲}{۱\text{tonFe}} = ۲ \times ۱۰^۸ \text{ gCO}_۷$$

$$\text{?m}^۳\text{CO}_۷ = ۲ \times ۱۰^۸ \text{ gCO}_۷ \times \frac{۱\text{molCO}_۷}{۴۴ \text{ gCO}_۷} \times \frac{۲۲ / ۴ \text{ LCO}_۷}{۱\text{molCO}_۷} \times \frac{۱\text{m}^۳\text{CO}_۷}{۱۰۰۰ \text{ LCO}_۷} = ۰ / ۱ \times ۱۰^۶ \text{ m}^۳\text{CO}_۷$$

۲۴۶. گزینه ۲ درست است.

زیرا، با توجه به داده‌های جدول، معادله انحلال پذیری سدیم نیترات به صورت  $۸ + ۷۲ / ۸ = ۸۰$  است. بنابراین، با استفاده از این

معادله، ابتدا جرم نمک حل شده در  $۱۰۰$  گرم آب را در دمای  $۶۵^\circ\text{C}$  محاسبه می‌کنیم:

$$S_{۶۵^\circ\text{C}} = ۰ / ۸(۶۵) + ۷۲ = ۱۲۴$$

$$m_{(۶۵^\circ\text{C})} = ۱۲۴ + ۱۰۰ = ۲۲۴ \text{ g}$$


$$m_{(۳^\circ\text{C})} = ۹۶ + ۱۰۰ = ۱۹۶ \text{ g}$$

$$۲۲۴ - ۱۹۶ = 28 \text{ g}$$

$$\text{?g} = ۶۴ \text{ g} \times \frac{۲۸ \text{ g}}{۲۲۴ \text{ g}} = 8 \text{ g}$$

۲۴۷. گزینه ۱ درست است.

زیرا، داریم:



$$۰ / ۲ \text{ molC}_n\text{H}_{2n+2} \times \frac{\left(\frac{3n+1}{2}\right)\text{O}_2}{۱\text{ molC}_n\text{H}_{2n+2}} \times \frac{۳۲ \text{ gO}_2}{۱\text{ molO}_2} = ۳۲ \text{ gO}_2 \Rightarrow n = ۳$$

با توجه به این که شمار کربن‌ها برابر با  $3$  شده است، پس هیدروکربن مورد نظر، پروپان است.

۲۴۸. گزینه ۳ درست است.

زیرا، داریم:

$$?g\text{NH}_3 = 3\text{molH}_2 \times \frac{2\text{molNH}_3}{3\text{molH}_2} \times \frac{17\text{gNH}_3}{1\text{molNH}_3} = 34\text{gNH}_3$$

$$\frac{6/18\text{gNH}_3}{34\text{gNH}_3} \times 100 = 20\%$$

۲۴۹. گزینه ۲ درست است.




زیرا، داریم:

$$\frac{\text{مقدار عمل}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 \Rightarrow 60 = \frac{75}{x} \times 100 \Rightarrow x = 125\text{g}$$

$$?g\text{C}_2\text{H}_{10} = 125\text{gC}_2\text{H}_6\text{O}_4 \times \frac{1\text{molC}_2\text{H}_6\text{O}_4}{166\text{gC}_2\text{H}_6\text{O}_4} \times \frac{1\text{molC}_2\text{H}_{10}}{1\text{molC}_2\text{H}_6\text{O}_4} \times \frac{106\text{gC}_2\text{H}_{10}}{1\text{molC}_2\text{H}_{10}} \times \frac{100\text{g}}{74\text{g}} = 107/18\text{gC}_2\text{H}_{10}$$

۲۵۰. گزینه ۴ درست است.

زیرا، داریم:




۲۵۱. گزینه ۳ درست است.

زیرا، فمول مولکولی بنزوئیک اسید،  $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$  است.

۲۵۲. گزینه ۱ درست است.

زیرا، داریم:



$$?g\text{CO}_2 = 1\text{min} \times \frac{8550\text{gC}_2\text{H}_{10}}{60\text{min}} \times \frac{1\text{molC}_2\text{H}_{10}}{114\text{gC}_2\text{H}_{10}} \times \frac{16\text{molCO}_2}{2\text{molC}_2\text{H}_{10}} \times \frac{44\text{gCO}_2}{1\text{molCO}_2} = 440\text{g}\cdot\text{min}^{-1}$$

۲۵۳. گزینه ۲ درست است.

زیرا، با گذشت زمان، سرعت متوسط مصرف و تولید تمام گونه‌ها کاهش می‌یابد.

۲۵۴. گزینه ۱ درست است.

زیرا، پایی اتن سنگین، بدون شاخه است.

۲۵۵. گزینه ۳ درست است.

زیرا، این نسبت در وینیل کلرید، سیانو اتن و اتن برابر  $\frac{1}{3}$  است.

۲۵۶. گزینه ۲ درست است.

زیرا، داریم:

$$\begin{aligned} \text{دی اسید} & \times \frac{\text{پلی آمید}}{5\text{mol}} \times \frac{166\text{g}}{1\text{mol}} \times \frac{1\text{kg}}{1000\text{g}} \\ 15/77\text{kg} & = \frac{\text{دی اسید}}{\text{پلی آمید}} \times \frac{166}{1000} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow n = \frac{15/77 \times 1000}{0/5 \times 166} = 190$$


۲۵۷. گزینه ۴ درست است.

زیرا، با توجه به این که فرمول عمومی صابون جامدی که زنجیر آلکیلی آن سیرشده است به صورت  $C_nH_{2n+1}COONa$  است که در صورت وجود یک پیوند دوگانه در زنجیر آلکیلی به صورت  $C_nH_{2n-1}COONa$  در می‌آید، پس جرم مولی صابون مورد نظر برابر است با:  $17(12) + 31(1) + 16(2) + 23 = 290 \text{ g.mol}^{-1}$ . جرم مولی الكل سه عاملی سازنده این چربی نیز برابر  $92 \text{ g.mol}^{-1}$  می‌باشد.

۲۵۸. گزینه ۱ درست است.

زیرا، داریم:

$$pH = -\log[H_3O^+] \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$



$10^{-2}$	$x$	$x$
$10^{-2}$	$+x$	$+x$
$10^{-2}$	$10^{-2}$	$10^{-2}$

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{(10^{-2})^2}{10^{-8}} = 1/25 \times 10^{-3}$$


۲۵۹. گزینه ۲ درست است.

زیرا، داریم:

$$pH = 2/7 \Rightarrow [H^+] = 10^{-2/7} = 10^{-3} \times 10^{0/7} = 2 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[H^+]_L = \frac{(2 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}) \times 150 \text{ L}}{10 \text{ L}} = 0.03 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[H^+]_L = n \times \alpha \times [HA] = 1 \times 1 \times 0.03 = 0.03 \text{ mol.L}^{-1}$$




$$?gKOH = 1L \times \frac{0.03 \text{ mol.HA}}{1L} \times \frac{1 \text{ mol.KOH}}{1 \text{ mol.HA}} \times \frac{56 \text{ g.KOH}}{1 \text{ mol.KOH}} = 1/68 \text{ g.KOH}$$

۲۶۰. گزینه ۳ درست است.

زیرا، در برگافت سدیم کلرید مذاب، نیم واکنش انجام شده در قطب مثبت به صورت  $2Cl^- \rightarrow Cl_2(g) + 2e^-$  است. و در فرایند آبکاری قاشق فلزی با نقره، قاشق فلزی نقش الکترود کاتد را دارد ولی کاهش نمی‌یابد.

۲۶۱. گزینه ۱ درست است.

زیرا، داریم:



$$\text{?mol Cu}^{2+} = 250 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ mol CuSO}_4}{1000 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mol Cu}^{2+}}{1 \text{ mol CuSO}_4} = 0.25 \text{ mol Cu}^{2+}$$

مقدار مول  $\text{Cu}^{2+}$  اولیه برابر است با:  $0.25$

$$\text{?mol Cu}^{2+} = 9/6 \text{ g Cu} \times \frac{1 \text{ mol Cu}}{64 \text{ g Cu}} \times \frac{1 \text{ mol Cu}^{2+}}{1 \text{ mol Cu}} = 0.15 \text{ mol Cu}^{2+}$$


و مقدار مول  $\text{Cu}^{2+}$  مصرف شده:  $0.15$

$0.25 - 0.15 = 0.1$  باقیمانده در محلول برابر است با:  $0.1 \text{ mol Cu}^{2+}$

$$\text{?mol Al}^{3+} = 0.15 \text{ mol Cu}^{2+} \times \frac{2 \text{ mol Al}^{3+}}{3 \text{ mol Cu}^{2+}} = 0.1 \text{ mol Al}^{3+}$$

۲۶۲. گزینه ۴ درست است.

زیرا، داریم:



$$\text{?g Fe(OH)}_3 = 3/36 \text{ LO}_2 \times \frac{1 \text{ mol O}_2}{22/4 \text{ LO}_2} \times \frac{4 \text{ mol Fe(OH)}_3}{3 \text{ mol O}_2} \times \frac{107 \text{ g Fe(OH)}_3}{1 \text{ mol Fe(OH)}_3} = 21/4 \text{ g Fe(OH)}_3$$

۲۶۳. گزینه ۳ درست است.

زیرا، داریم:

$$\text{?g SiO}_3 = 500 \text{ g} \times \frac{46/2}{100 \text{ g}} = 231 \text{ g SiO}_3$$

$$\text{?g H}_2\text{O} = 500 \text{ g} \times \frac{13/32}{100 \text{ g}} = 66/6 \text{ g H}_2\text{O}$$

$500 - (231 + 66/6) = 202/4 \text{ g}$  = مجموع جرم جامد های یونی در نمونه

$500 - 231 = 269 \text{ g}$  = جرم نمونه بعد از فرایند جداسازی

$$\frac{202/4}{269} \times 100 \approx 75\%$$

= مجموع درصد جرمی جامد های یونی در نمونه

۲۶۴. گزینه ۴ درست است.

زیرا، توصیف به کار رفته مربوط به یک جامد کووالانسی است.

۲۶۵. گزینه ۲ درست است.

زیرا، قطبیت مولکول، شمار جفت الکترون های ناپیوندی و شمار اتم هایی که به آرایش هشتایی پایدار رسیده اند، در آن ها متفاوت است.

۲۶۶. گزینه ۱ درست است.

به صفحه ۸۰ کتاب درسی مراجعه شود.

۲۶۷. گزینه ۴ درست است.

زیرا، داریم:

$$\text{?kJ} = 2 \text{ mol O}_2 \times \frac{32 \text{ g O}_2}{1 \text{ mol O}_2} \times \frac{73/5 \text{ kJ}}{12 \text{ g O}_2} = 392 \text{ kJ}$$

$$18 \text{ kJ} + 392 \text{ kJ} = 410 \text{ kJ}$$

۲۶۸. گزینه ۲ درست است.

زیرا، داریم:

$$K = \frac{[H_2]^r}{[H_2O]^r}$$

$$16 = \frac{(rx)^r}{(0.5 - rx)^r} \Rightarrow r = \frac{rx}{0.5 - rx} \Rightarrow x = \frac{1}{12} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$[H_2] = rx = r \times \frac{1}{12} \text{ mol.L}^{-1} \approx 0.083 \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{?gH}_2 = 10 \text{ L} \times \frac{0.083 \text{ molH}_2}{\text{L}} \times \frac{2 \text{ gH}_2}{1 \text{ molH}_2} = 6.6 \text{ gH}_2$$

۲۶۹. گزینه ۱ درست است.

زیرا، داریم:

$$K = \frac{[I_2][Cl_2]}{[ICl]^2} = \frac{0.1[ICl] \times 0.1[ICl]}{[ICl]^2} = 0.01$$

۲۷۰. گزینه ۳ درست است.

زیرا، بر اثر کاهش حجم یک سامانه محتوی تعادل گازی در دمای ثابت، غلظت همه گازها افزایش می‌یابد.